Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 137 SGB V

Gesamtauswertung 2018

Modul DEK
Dekubitusprophylaxe

Gesamtauswertung

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach §137 SGB V ***Dekubitusprophylaxe***

Hinweise zur Auswertung

Seit dem Erfassungsjahr 2013 basiert die Jahresauswertung für das Modul DEK Dekubitusprophylaxe sowohl auf QS-Daten als auch auf Routinedaten (Risikostatistik). Die Daten umfassen alle stationär behandelten Patienten ab einem Alter von 20 Jahren. Ab dem Erfassungsjahr 2018 erfolgt die Erfassung der Risikostatistik fallbezogen.

Mit Aufnahme- und Entlassungsdatum in 2018 wurden insgesamt 25.885 QS-Datensätze fristgerecht (zertifiziert) und auswertbar (fehlerfrei) übermittelt. Als Überlieger – Aufnahme in 2017 und Entlassung 2018 wurden 1359 Datensätze einbezogen. Damit fließen in die Auswertung 196 Standorte ein mit insgesamt 27.244 auswertbaren QS-Datensätzen (maximale Fallzahl 914). Die bereinigte Dokumentationsrate (Überdokumentationen wurden nicht berücksichtigt) im Leistungsbereich Dekubitusprophylaxe betrug für Baden-Württemberg 99,45 %. Die Dokumentationsraten einzelner Einrichtungen sind ebenfalls über die Homepage der Geschäftsstelle unter dem Menüpunkt „Aktuelles & Veranstaltungen / Positivliste 2018“ einsehbar.
Eine Risikostatistik wurde insgesamt von 253 Standorten an die Geschäftsstelle übermittelt.

Die Berechnung der Ereignisse für die Qualitätsindikatoren erfolgt auf Basis von plausiblen QS-Datensätzen, d. h. für alle Patienten mit einem Alter von mindestens 20 Jahren und einem Dekubitus ab Grad 2, die im Jahr 2017 oder 2018 aufgenommen und bis zum 31.12.2018 entlassen wurden.

Die Berechnung der Grundgesamtheit für die Qualitätsindikatoren in der Auswertung erfolgt auf Basis der Risikostatistik für alle Patienten mit einem Alter von mindestens 20 Jahren, die im Jahr 2017 oder 2018 aufgenommen und bis zum 31.12.2018 entlassen wurden.

Aufbau der Einzelauswertung:

Die **Basisstatistik** stellt eine deskriptive Datenauswertung absoluter und relativer Häufigkeiten aller gesammelten Daten aus der Fragensammlung dar, zumeist ohne weitere Verknüpfung.

Im zweiten Teil der Auswertung werden **Qualitätsindikatoren** berechnet, die eine statistische Kennzahl darstellen und noch keine unmittelbare Aussage zur erbrachten Qualität erlauben. Durch Verwendung der Rechenregeln des IQTIG (© 2019 Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, Berlin) entsprechen die dargestellten Qualitätsindikatoren denen der Bundesauswertung, sodass die Möglichkeit zum Vergleich der Ergebnisse mit denen aller Krankenhäuser bundesweit gegeben ist. Angefügt ist des Weiteren eine Aufstellung der bundeseinheitlichen Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren nach aktuellem Kenntnisstand. Damit kann zeitnah mit der „Qualitätsarbeit“ begonnen werden.

Die Beschreibung der einzelnen Qualitätsindikatoren und der jeweilige fachliche Hintergrund können Sie unter dem jeweiligen Leistungsbereich über die Homepage des IQTIG (www.IQTIG.org) einsehen.

Die Grundgesamtheit aller Qualitätsindikatoren sowie die Risikoadjustierung des Qualitätsindikators ID 52009 beruhen ausschließlich auf den Daten der Risikostatistik. Diese enthält Angaben von Standorten, die nicht notwendigerweise auch Daten der Qualitätssicherung (QS-Daten) geliefert haben.

Bei der Risikoadjustierung werden die folgenden Risikofaktoren berücksichtigt:

- Adipositas
- Alter
- Beatmungsstunden
- Demenz und Vigilanzstörung
- Diabetes mellitus
- Infektionen
- Inkontinzenz
- Eingeschränkte Mobilität
- Untergewicht und Mangelernährung
- Weitere schwere Erkrankungen

Zur Berechnung des Risikoadjustierungsmodells werden die Informationen aus der Risikostatistik mit den QS-Daten verknüpft, um Informationen über die inzidenten Dekubitalulcera zu erhalten. Ab dem Erfassungsjahr 2018 erfolgt die Risikostatistik fallbezogen.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne die Geschäftsstelle der QiG BW GmbH in Stuttgart unter Telefon (07 11) 2 57 77-42.

Inhalt Gesamtauswertung 2018

Modul DEK

Dekubitusprophylaxe

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 QS-Daten

1.1 Gesamtdaten

1.1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze

1.1.2 Monatsverlauf korrekt übermittelter Datensätze (QS-Daten)

1.1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer (QS-Daten)

1.2 Gradeinteilung des höchstgradigen Dekubitus (QS-Daten)

1.3 Basisdokumentation (QS-Daten)

1.3.1 Verteilung der Altersgruppen (QS-Daten)

1.3.2 Angaben zu Geschlecht und Alter (QS-Daten)

1.3.3 Aufnahmegrund (QS-Daten)

1.4 Risikofaktoren (QS-Daten)

1.4.1 Risikofaktoren

1.5 Dekubitus (QS-Daten)

1.5.1 Wievielter Dekubitus?

1.5.2 War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")

1.5.3 War der Dekubitus bei der Entlassung vorhanden? ("Present on Discharge")

1.5.4 Neu aufgetretene Dekubitalulzera (Dekubitusinzidenz)

1.6 Entlassungsgrund (QS-Daten)

1.6.1 Entlassungsgrund

1.7 QS-Daten

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

2 Daten aus der Risikostatistik

2.1 Basisdaten

2.2 Altersverteilung (Daten aus der Risikostatistik)

2.3 Risikofaktoren (Daten aus der Risikostatistik)

1 QS-Daten

Hinweis: In der Auswertung wurden nur Datensätze berücksichtigt, die den Status "OK" haben.
Zu beachten ist, dass sich die Jahresauswertung zusammensetzen aus Fällen mit Aufnahme und Entlassung im Jahr 2018 und ergänzend den sogenannten Überliegern mit (Aufnahme = 2017) und (Entlassung 01.01.2018 bis 31.12.2018).

1.1 Gesamtdaten


1.1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze

	2018	2017
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl Krankenhäuser mit QS-Daten	196	194
Davon Anzahl Krankenhäuser mit vorhandener Risikostatistik	194	193
Fallzahl Gesamt	27244	27697
Fallzahl Minimum	1	1
Fallzahl Maximum	914	1009
Fallzahl an Überliegern (Aufnahme 2017)	1359	1284

Anmerkung zur Anzahl vorhandener Risikostatistiken: Aufgrund Schließung von Krankenhaus-Standorten wurden für diese Standorte keine Risikostatistik mehr übermittelt.

1.1.2 Monatsverlauf korrekt übermittelter Datensätze (QS-Daten)

Anteil der Entlassungen pro Monat im aktuellen Jahr bezogen auf alle gelieferten Datensätze



1.1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer (QS-Daten)

Stationäre Aufenthaltsdauer (Tage)		2018	2017
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Aufenthaltsdauer	**(Anzahl)**	27244	27697
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	12,0	12,0
Mittelwert	(Tage)	19,1	18,9
Maximum	(Tage)	427	393

1.2 Gradeinteilung des höchstgradigen Dekubitus (QS-Daten)


Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes (Beschränkung auf 4 Stellen)	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
L89.1 Dekubitus 2. Grades	22012/34246	64,3%	22669/34975	64,8%
L89.3 Dekubitus 4. Grades	3817/34246	11,1%	3746/34975	10,7%
L89.2 Dekubitus 3. Grades	7841/34246	22,9%	7999/34975	22,9%
L89.9 Dekubitus n.n.bez.	576/34246	1,7%	561/34975	1,6%

ausführliche Darstellung der Kodes siehe Kapitel 1.7

1.3 Basisdokumentation (QS-Daten)

1.3.1 Verteilung der Altersgruppen (QS-Daten)

Verteilung der Altersgruppen	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
20-33 Jahre	215	0,8%	230	0,8%
34-46 Jahre	531	1,9%	535	1,9%
47-54 Jahre	1039	3,8%	1074	3,9%
55-61 Jahre	1766	6,5%	1789	6,5%
62-68 Jahre	2809	10,3%	2892	10,4%
69-72 Jahre	1945	7,1%	2025	7,3%
73-76 Jahre	2850	10,5%	3134	11,3%
77-80 Jahre	4256	15,6%	4146	15,0%
81-85 Jahre	5132	18,8%	5129	18,5%
>=86 Jahre	6701	24,6%	6743	24,3%
Gesamt	27244	100,0%	27697	100,0%



1.3.2 Angaben zu Geschlecht und Alter (QS-Daten)

Statistische Alterswerte		2018		2017	
		Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
		Anzahl	%	Anzahl	%
männlich	**(Anzahl)**	14235	52,3%	14603	52,7%
Minimum	(Jahre)	20		20	
Median	(Jahre)	77,0		77,0	
Mittelwert	(Jahre)	74,0		73,9	
Maximum	(Jahre)	102		104	
weiblich	**(Anzahl)**	13007	47,7%	13092	47,3%
Minimum	(Jahre)	20		20	
Median	(Jahre)	81,0		81,0	
Mittelwert	(Jahre)	78,8		78,6	
Maximum	(Jahre)	107		107	
unbestimmt	**(Anzahl)**	0	0,0%	1	0,0%
Minimum	(Jahre)	0		54	
Median	(Jahre)	0,0		54,0	
Mittelwert	(Jahre)	0,0		54,0	
Maximum	(Jahre)	0		54	
unbekannt	**(Anzahl)**	2	0,0%	1	0,0%
Minimum	(Jahre)	62		80	
Median	(Jahre)	72,0		80,0	
Mittelwert	(Jahre)	72,0		80,0	
Maximum	(Jahre)	82,0		80,0	
gesamt	**(Anzahl)**	27244	100,0%	27697	100,0%
Minimum	(Jahre)	20		20	
Median	(Jahre)	79,0		79,0	
Mittelwert	(Jahre)	76,3		76,2	
Maximum	(Jahre)	107		107	

1.3.3 Aufnahmegrund (QS-Daten)

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Krankenhausbehandlung, vollstationär	26701	98,0%	27099	97,8%
Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	535	2,0%	591	2,1%
stationäre Entbindung	6	0,0%	5	0,0%
Geburt	0	0,0%	0	0,0%
Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003	2	0,0%	2	0,0%
stationäre Aufnahme zur Organentnahme	0	0,0%	0	0,0%
Gesamt	27244	100,0%	27697	100,0%

1.4 Risikofaktoren (QS-Daten)

1.4.1 Risikofaktoren

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Diabetes Mellitus Typ 1 oder 2 (gemäß ICD-10-GM: E10.-, E11.-)	9234/27244	33,9%	9451/27697	34,1%
sonstiger Diabetes Mellitus (gemäß ICD-10-GM: E13.-)	233/27244	0,9%	217/27697	0,8%
eingeschränkte Mobilität (gemäß ICD-10-GM: G20.-, G81.-, G82.-, G83.-, M24.5, M62.-, R26.3, R40.-, R46.-, S14.-, S24.-, Z74.0, Z99.3)	15329/27244	56,3%	14542/27697	52,5%
Infektion (gemäß ICD-10-GM: A40.-, A41.-, J15.-, J16.-, J17.-, J18.-, J69.-, M72.6, M86.-, R57.2, R65.-)	9006/27244	33,1%	8423/27697	30,4%
Demenz und Vigilanzstörung (gemäß ICD-10-GM: F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, G30.-)	5175/27244	19,0%	4944/27697	17,9%
Inkontinenz (gemäß ICD-10-GM: N39.-, R15.-, R32.-)	13272/27244	48,7%	12880/27697	46,5%
Untergewicht oder Mangelernährung (gemäß ICD-10-GM: E41.-, E43.-, E44.-, E46.-, R64.-)	2646/27244	9,7%	2504/27697	9,0%
Adipositas (gemäß ICD-10-GM: E66.X2)	630/27244	2,3%	559/27697	2,0%
weitere schwere Erkrankungen (gemäß ICD-10-GM: B37.1, B37.7, D50.-, D51.-, D52.-, D53.-, D61.-, D62.-, D63.-, D64.-, D72.8, G63.2, K70.-, K72.-, K74.-, N17.-, N18.4, N18.5, N99.0, R18, R34, R60.-, R77.0, U69.00, Z99.2)	14826/27244	54,4%	13627/27697	49,2%
Dauer der Beatmung = 0 Stunden	23826/27244	87,5%	24079/27697	86,9%
Dauer der Beatmung >= 1 Stunde	3418/27244	12,5%	3618/27697	13,1%

1.4.1 Risikofaktoren

Dauer der Beatmung (>=1 Stunde)		2018	2017
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
		Anzahl	Anzahl
Dauer der Beatmung	**(Anzahl)**	3418	3618
Minimum	(Stunden)	1	1
Median	(Stunden)	146,5	142,0
Mittelwert	(Stunden)	297,9	300,2
Maximum	(Stunden)	5252	5929

1.5 Dekubitus (QS-Daten)

1.5.1 Wievielter Dekubitus?

	2018	2017
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl	34246	34975
Minimum	1	1
Median	1,0	1,0
Mittelwert	1,3	1,3
Maximum	9	9

1.5.2 War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")

POA - Present on Admission	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
(0) Nein: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht vorhanden	7332	21,4%	7469	21,4%
(1) Ja: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus vorhanden	26679	77,9%	27226	77,8%
(9) Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	235	0,7%	280	0,8%
Gesamt	34246	100,0%	34975	100,0%

Dekubitus-Status bei Aufnahme bezieht sich auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Grad

1.5.3 War der Dekubitus bei der Entlassung vorhanden? ("Present on Discharge")

POD - Present on Discharge	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
(0) Nein: Diagnose war bei Entlassung aus dem Krankenhaus nicht vorhanden	4611	13,5%	5084	14,5%
(1) Ja: Diagnose war bei Entlassung aus dem Krankenhaus vorhanden	29058	84,9%	29338	83,9%
(9) Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	577	1,7%	553	1,6%
Gesamt	34246	100,0%	34975	100,0%

Dekubitus-Status bei Aufnahme bezieht sich auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Grad

1.5.4 Neu aufgetretene Dekubitalulzera (Dekubitusinzidenz)

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 2 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	6430/27244	23,6%	6692/27697	24,2%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 3 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	924/27244	3,4%	860/27697	3,1%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 4 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	91/27244	0,3%	95/27697	0,3%
Stationär erworbener Dekubitus Grad nicht näher bezeichnet bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	122/27244	0,4%	102/27697	0,4%

Stationär erworben bedeutet, dass die Angabe zu POA ("Present on Admission") des höchstgradigen Dekubitus nein oder unbekannt ist

1.6 Entlassungsgrund (QS-Daten)

1.6.1 Entlassungsgrund

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
01 Behandlung regulär beendet	12918/27244	47,4%	13258/27697	47,9%
02 Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	562/27244	2,1%	546/27697	2,0%
03 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	30/27244	0,1%	38/27697	0,1%
04 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	92/27244	0,3%	121/27697	0,4%
05 Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0/27244	0,0%	0/27697	0,0%
06 Verlegung in ein anderes Krankenhaus	2101/27244	7,7%	2186/27697	7,9%
07 Tod	4639/27244	17,0%	4560/27697	16,5%
08 Verlegung in ein anderes Krankenhaus i. R. e. Zusammenarbeit	35/27244	0,1%	37/27697	0,1%
09 Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	1861/27244	6,8%	1902/27697	6,9%
10 Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	4697/27244	17,2%	4733/27697	17,1%
11 Entlassung in ein Hospiz	127/27244	0,5%	127/27697	0,5%
13 externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	127/27244	0,5%	127/27697	0,5%
14 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	3/27244	0,0%	2/27697	0,0%
15 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	4/27244	0,0%	2/27697	0,0%
17 int. Verleg. mit Wechsel zw. den Entg. ber. der DRG-Fallpauschalen	147/27244	0,5%	161/27697	0,6%
22 Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung	0/27244	0,0%	1/27697	0,0%
25 Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)	0/27244	0,0%	0/27697	0,0%
Gesamt	27244/27244	100,0%	27697/27697	100,0%

1.7 QS-Daten

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:
L89.1: Dekubitus 2. Grades
L89.2: Dekubitus 3. Grades
L89.3: Dekubitus 4. Grades
L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus 2. Grades: Kopf	434/34246	1,3%	496/34975	1,4%
Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität	305/34246	0,9%	281/34975	0,8%
Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze	177/34246	0,5%	177/34975	0,5%
Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm	269/34246	0,8%	246/34975	0,7%
Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein	9508/34246	27,8%	9377/34975	26,8%
Dekubitus 2. Grades: Sitzbein	3290/34246	9,6%	3628/34975	10,4%
Dekubitus 2. Grades: Trochanter	890/34246	2,6%	886/34975	2,5%
Dekubitus 2. Grades: Ferse	4331/34246	12,6%	4586/34975	13,1%
Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	1903/34246	5,6%	2012/34975	5,8%
Dekubitus 2. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	905/34246	2,6%	980/34975	2,8%
Dekubitus 3. Grades: Kopf	109/34246	0,3%	93/34975	0,3%
Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität	103/34246	0,3%	124/34975	0,4%
Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze	41/34246	0,1%	38/34975	0,1%
Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm	72/34246	0,2%	86/34975	0,2%
Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein	2586/34246	7,6%	2486/34975	7,1%
Dekubitus 3. Grades: Sitzbein	682/34246	2,0%	813/34975	2,3%
Dekubitus 3. Grades: Trochanter	416/34246	1,2%	421/34975	1,2%
Dekubitus 3. Grades: Ferse	2327/34246	6,8%	2350/34975	6,7%
Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	1244/34246	3,6%	1300/34975	3,7%
Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	261/34246	0,8%	288/34975	0,8%

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:
L89.1: Dekubitus 2. Grades
L89.2: Dekubitus 3. Grades
L89.3: Dekubitus 4. Grades
L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus 4. Grades: Kopf	22/34246	0,1%	20/34975	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität	40/34246	0,1%	33/34975	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze	8/34246	0,0%	15/34975	0,0%
Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm	33/34246	0,1%	21/34975	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein	1465/34246	4,3%	1387/34975	4,0%
Dekubitus 4. Grades: Sitzbein	482/34246	1,4%	478/34975	1,4%
Dekubitus 4. Grades: Trochanter	292/34246	0,9%	278/34975	0,8%
Dekubitus 4. Grades: Ferse	781/34246	2,3%	832/34975	2,4%
Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	621/34246	1,8%	602/34975	1,7%
Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	73/34246	0,2%	80/34975	0,2%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kopf	10/34246	0,0%	12/34975	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Obere Extremität	23/34246	0,1%	5/34975	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze	3/34246	0,0%	4/34975	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Beckenkamm	12/34246	0,0%	11/34975	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kreuzbein	162/34246	0,5%	139/34975	0,4%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sitzbein	47/34246	0,1%	70/34975	0,2%

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:
L89.1: Dekubitus 2. Grades
L89.2: Dekubitus 3. Grades
L89.3: Dekubitus 4. Grades
L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Trochanter	14/34246	0,0%	17/34975	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Ferse	124/34246	0,4%	88/34975	0,3%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	91/34246	0,3%	103/34975	0,3%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	90/34246	0,3%	112/34975	0,3%

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
100. Innere Medizin A	9007	32,0%	9073	31,6%
102. Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie	298	1,1%	249	0,9%
103. Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie	845	3,0%	794	2,8%
104. Innere Medizin/Schwerpunkt Nephrologie	250	0,9%	261	0,9%
105. Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	299	1,1%	348	1,2%
106. Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrinologie	11	0,0%	4	0,0%
107. Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie	1298	4,6%	1336	4,7%
108. Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie	194	0,7%	144	0,5%
109. Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie	50	0,2%	58	0,2%
114. Innere Medizin/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	13	0,0%	6	0,0%
153. Innere Medizin/Schwerpunkt Diabetes	386	1,4%	370	1,3%
154. Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheilkunde	4	0,0%	5	0,0%
190. Innere Medizin B	235	0,8%	269	0,9%
191. Innere Medizin C	5	0,0%	5	0,0%
200. Geriatrie	329	1,2%	337	1,2%
290. Geriatrie	1	0,0%		
300. Kardiologie	755	2,7%	759	2,6%
400. Nephrologie	222	0,8%	185	0,6%
500. Hämatologie und internistische Onkologie	398	1,4%	477	1,7%
590. Hämatologie und internistische Onkologie	1	0,0%	1	0,0%
600. Endokrinologie	18	0,1%	12	0,0%
700. Gastroenterologie	732	2,6%	698	2,4%
800. Pneumologie	210	0,7%	244	0,9%
891. Pneumologie	18	0,1%	11	0,0%
900. Rheumatologie	6	0,0%	6	0,0%
1000. Pädiatrie	8	0,0%	6	0,0%
1028. Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderneurologie	1	0,0%	1	0,0%
1200. Neonatologie	1	0,0%	1	0,0%

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1500. Allgemeine Chirurgie I	2952	10,5%	3255	11,4%
1516. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie	390	1,4%	406	1,4%
1518. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie	113	0,4%	113	0,4%
1519. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie	4	0,0%	6	0,0%
1520. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie	8	0,0%	2	0,0%
1523. Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie	88	0,3%	72	0,3%
1536. Chirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BPflV am 31.12.2003 geltenden Fassung)	43	0,2%	42	0,1%
1550. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie	140	0,5%	94	0,3%
1551. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Handchirurgie	31	0,1%	26	0,1%
1590. Allgemeine Chirurgie II	39	0,1%	25	0,1%
1591. Allgemeine Chirurgie III	20	0,1%	20	0,1%
1592. Allgemeine Chirurgie IV	4	0,0%	1	0,0%
1600. Unfallchirurgie	1589	5,6%	1686	5,9%
1690. Unfallchirurgie	34	0,1%	30	0,1%
1700. Neurochirurgie	267	0,9%	278	1,0%
1800. Gefäßchirurgie	522	1,9%	500	1,7%
1900. Plastische Chirurgie	260	0,9%	252	0,9%
2000. Thoraxchirurgie	111	0,4%	135	0,5%
2090. Thoraxchirurgie	1	0,0%	2	0,0%
2100. Herzchirurgie	224	0,8%	250	0,9%
2118. Herzchirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie	15	0,1%	4	0,0%
2200. Urologie	646	2,3%	729	2,5%
2300. Orthopädie	673	2,4%	655	2,3%
2315. Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie	30	0,1%	40	0,1%
2316. Orthopädie und Unfallchirurgie	12	0,0%	6	0,0%
2390. Orthopädie	204	0,7%	201	0,7%
2400. Frauenheilkunde und Geburtshilfe	149	0,5%	140	0,5%
2425. Frauenheilkunde	11	0,0%	20	0,1%

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
2490. Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1	0,0%		
2600. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	104	0,4%	97	0,3%
2700. Augenheilkunde	48	0,2%	52	0,2%
2800. Neurologie	1338	4,7%	1415	4,9%
2856. Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	113	0,4%	99	0,3%
2890. Neurologie	1	0,0%		
2891. Neurologie	18	0,1%	24	0,1%
2900. Allgemeine Psychiatrie	257	0,9%	294	1,0%
2950. Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung	20	0,1%	10	0,0%
2951. Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie	211	0,7%	170	0,6%
3100. Psychosomatik/Psychotherapie	2	0,0%	3	0,0%
3300. Strahlenheilkunde	107	0,4%	105	0,4%
3305. Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	14	0,0%	15	0,1%
3350. Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Radiologie	14	0,0%	18	0,1%
3390. Strahlenheilkunde	7	0,0%	8	0,0%
3400. Dermatologie	187	0,7%	167	0,6%
3500. Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	50	0,2%	51	0,2%
3600. Intensivmedizin	959	3,4%	1013	3,5%
3601. Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin	76	0,3%	56	0,2%
3618. Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie	27	0,1%	29	0,1%
3650. Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie	27	0,1%	16	0,1%
3690. Intensivmedizin	21	0,1%	19	0,1%
3691. Intensivmedizin	1	0,0%		
3700. sonstige Fachabteilung I	107	0,4%	96	0,3%
3751. Radiologie	1	0,0%		
3752. Palliativmedizin	182	0,6%	169	0,6%
3753. Schmerztherapie	2	0,0%	1	0,0%
3755. Wirbelsäulenchirurgie	20	0,1%	16	0,1%

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
3756. Suchtmedizin	2	0,0%	1	0,0%
3757. Visceralchirurgie	12	0,0%		
3790. Sonstige Fachabteilung II	69	0,2%	59	0,2%

2 Daten aus der Risikostatistik

2.1 Basisdaten

Angaben über Krankenhäuser mit Risikostatistik	2018 Baden-Württemberg Anzahl	2017 Baden-Württemberg Anzahl
Anzahl Krankenhäuser mit Risikostatistik	253	256
Davon Anzahl Krankenhäuser mit Patienten mit Dekubitus ab Grad 2 vorhanden	194	191
Davon Anzahl Krankenhäuser mit erfolgter QS-Dokumentation	196	194

	2018 Baden-Württemberg		2017 Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit Dekubitus	27255/1956602	1,4%	27630/1969983	1,4%
Grad 2 (L89.1)	17375/27255	63,7%	17861/27630	64,6%
Grad 3 (L89.2)	6217/27255	22,8%	6155/27630	22,3%
Grad 4 (L89.3)	3302/27255	12,1%	3136/27630	11,3%
Grad n.n.bez. (L89.9)	487/27255	1,8%	478/27630	1,7%

2.2 Altersverteilung (Daten aus der Risikostatistik)

Altersverteilung - Patienten gesamt	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten gesamt	1956602/1956602	100,0%	1969983/1969983	100,0%
20-33 Jahre	254976/1956602	13,0%	258886/1969983	13,1%
34-46 Jahre	226032/1956602	11,6%	229712/1969983	11,7%
47-54 Jahre	198823/1956602	10,2%	205475/1969983	10,4%
55-61 Jahre	217711/1956602	11,1%	215458/1969983	10,9%
62-68 Jahre	227698/1956602	11,6%	227979/1969983	11,6%
69-72 Jahre	129386/1956602	6,6%	124858/1969983	6,3%
73-76 Jahre	154210/1956602	7,9%	168700/1969983	8,6%
77-80 Jahre	198028/1956602	10,1%	197409/1969983	10,0%
81-85 Jahre	187388/1956602	9,6%	179330/1969983	9,1%
>= 86 Jahre	162350/1956602	8,3%	162176/1969983	8,2%

Statistische Alterswerte		2018		2017	
		Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
		Anzahl	%	Anzahl	%
gesamt	**(Anzahl)**	1956602			
Minimum	(Jahre)	20			
Median	(Jahre)	64,0			
Mittelwert	(Jahre)	61,2			
Maximum	(Jahre)	118			

Altersverteilung - Patienten mit Dekubitus	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten gesamt	27255/1956602	1,4%	27630/1969983	1,4%
20-33 Jahre	216/27255	0,8%	245/27630	0,9%
34-46 Jahre	525/27255	1,9%	527/27630	1,9%
47-54 Jahre	1041/27255	3,8%	1071/27630	3,9%
55-61 Jahre	1777/27255	6,5%	1794/27630	6,5%
62-68 Jahre	2814/27255	10,3%	2883/27630	10,4%
69-72 Jahre	1953/27255	7,2%	2011/27630	7,3%
73-76 Jahre	2846/27255	10,4%	3112/27630	11,3%
77-80 Jahre	4259/27255	15,6%	4128/27630	14,9%
81-85 Jahre	5129/27255	18,8%	5134/27630	18,6%
>= 86 Jahre	6695/27255	24,6%	6725/27630	24,3%

Statistische Alterswerte (Patienten mit Dekubitus)		2018		2017	
		Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
		Anzahl	%	Anzahl	%
gesamt	**(Anzahl)**	27255			
Minimum	(Jahre)	20			
Median	(Jahre)	79,0			
Mittelwert	(Jahre)	76,3			
Maximum	(Jahre)	107			

2.3 Risikofaktoren (Daten aus der Risikostatistik)

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Diabetes mellitus	310473/1956602	15,9%	313184/1969983	15,9%
Dauer der Beatmung 25 bis 72 Stunden	9394/1956602	0,5%	8638/1969983	0,4%
Dauer der Beatmung 73 bis 240 Stunden	8758/1956602	0,4%	9532/1969983	0,5%
Dauer der Beatmung über 240 Stunden	6363/1956602	0,3%	6171/1969983	0,3%
eingeschränkte Mobilität	263683/1956602	13,5%	231676/1969983	11,8%
Infektion	117252/1956602	6,0%	109338/1969983	5,6%
Demenz und Vigilanzstörung	79627/1956602	4,1%	76941/1969983	3,9%
Untergewicht und Mangelernährung	35904/1956602	1,8%	35716/1969983	1,8%
Inkontinenz	200872/1956602	10,3%	201167/1969983	10,2%
Adipositas	29588/1956602	1,5%	27805/1969983	1,4%
weitere schwere Erkrankungen	320337/1956602	16,4%	284433/1969983	14,4%

Dauer der Beatmung		2018	2017
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
		Anzahl	Anzahl
gesamt	**(Anzahl)**	43300	
Minimum	(Stunden)	1	
Median	(Stunden)	32,0	
Mittelwert	(Stunden)	121,1	
Maximum	(Stunden)	5252	

Inhalt Gesamtauswertung 2018

Modul DEK

Dekubitusprophylaxe

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 Alle Patientientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Deku- bitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.1 Alle Patientientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Deku- bitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.3 Risikofaktoren zum verwendeten Dekubitus-Score für QI-ID 50009 © IQTIG 2019

2 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

2.1 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2 (TKez 52326)

2.2 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitus Grad/Kategorie 3 (TKez 521801)

2.3 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet (TKez 521800)

3 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4

3.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4 (QI-ID 52010)

1 Alle Patientientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Deku- bitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

Qualitätsziel: Möglichst wenig neu aufgetretene Dekubitalulcera Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad/bezeichneter Kategorie bei Patientinnen und Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden oder für die nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

1.1 Alle Patientientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Deku- bitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)


Indikator-ID: 52008

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik

Zähler: Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert; Kennzahl zum nachfolgenden Qualitätsindikator

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1) (ID 52008)	6707/1956602	0,34%	6833/1969983	0,35%
Vertrauensbereich		(0,33% - 0,35%)		(0,34% - 0,36%)



Hinweise:
- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

Indikator-ID: 52009

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik

Zähler: Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: <= 2,31 (95. Perzentil)

Kalkulatorische Kennzahlen	2018	2017
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
beobachtet (O) °	6707	6833
O_52009	0,34%	0,35%
vorhergesagt (E) *	6.862,37	6.869,86
E_52009	0,35%	0,35%
Gesamt	1956602	1969983
O - E *	-0,01%	0,00%

° Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand.

* Erwartete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, risikoadjustiert nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009.
Der Zähler der kalkulatorischen Kennzahl mit der Kennzahl-ID E_52009 wird durch die kalkulatorische Kennzahl mit der Kennzahl-ID 23014_52009 berechnet und bildet den Score zur logistischen Regression für den Indikator mit der QI-ID 52009 ab.
Der Nenner der kalkulatorischen Kennzahl mit der Kennzahl-ID E_52009 wird durch die kalkulatorische Kennzahl mit der Kennzahl-ID 24851_52009 berechnet und bildet alle vollstationären Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik ab.


	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
O / E ** (ID 52009)	0,98		0,99	
Vertrauensbereich		(0,95 - 1,00)		(0,97 - 1,02)

** Verhältnis der beobachteten Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, zur erwarteten Rate.

Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, kleiner ist als erwartet und umgekehrt.
Beispiel:
O / E = 1,2 Die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, ist 20% größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, ist 10% kleiner als erwartet.

Aufgrund von Spezifikationsänderungen und der fallbezogenen Erfassung der Risikostatistik ab dem Erfassungsjahr 2018 sind die aktuellen Werte mit den Vorjahreswerten nur eingeschränkt vergleichbar.

1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)



Hinweise:
- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

1.3 Risikofaktoren zum verwendeten Dekubitus-Score für QI-ID 50009 © IQTIG 2019

Risikofaktoren

Referenzwahrscheinlichkeit: 0,017 % (Odds: 0,000)					
Risikofaktor	**Regressionskoeffizient**	**Std.-Fehler**	**Z-Wert**	**Odds-Ratio**	**95 %-Vertrauensbereich**
Konstante	-8,690007392593012	0,036	-241,640	-	-
Alter (linear zwischen 31 und 97 Jahren)	0,090244136846490	0,003	26,228	1,094	1,087 - 1,102
Alter (quadratisch zwischen 31 und 97 Jahren)	-0,001410514758855	0,000	-13,475	0,999	0,998 - 0,999
Alter (kubisch zwischen 31 und 97 Jahren)	0,000009364890709	0,000	9,651	1,000	1,000 - 1,000
Dauer der Beatmung 24 bis 71 Stunden	0,886810346484583	0,024	36,819	2,427	2,315 - 2,545
Dauer der Beatmung 72 bis 239 Stunden	1,319522263073722	0,019	69,569	3,742	3,605 - 3,883
Dauer der Beatmung ab 240 Stunden	2,208658520402705	0,014	152,597	9,103	8,849 - 9,365
Diabetes Mellitus	0,153412939317293	0,009	17,363	1,166	1,146 - 1,186
Eingeschränkte Mobilität	0,756747276339805	0,009	84,588	2,131	2,094 - 2,169
Infektion	0,717690959643532	0,010	71,473	2,050	2,010 - 2,090
Demenz und Vigilanzstörung	0,103990120042886	0,012	8,395	1,110	1,083 - 1,137
Inkontinenz	0,728122976315701	0,009	79,154	2,071	2,034 - 2,109
Untergewicht und Mangelernährung	0,680188918920693	0,013	53,719	1,974	1,926 - 2,024
Adipositas	0,111415805930087	0,026	4,228	1,118	1,062 - 1,177
Weitere schwere Erkrankungen	1,335281222420371	0,009	141,610	3,801	3,731 - 3,872

2 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

2.1 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2 (TKez 52326)


Indikator-ID: 52326

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24854_52326)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 52326)	5872/1956602	0,30%	5876/1969983	0,30%
Vertrauensbereich		(0,29% - 0,31%)		(0,29% - 0,31%)



Hinweise:
- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

2.2 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitus Grad/Kategorie 3 (TKez 521801)


Indikator-ID: 521801

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationären Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24855_521801)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 3, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 3, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 521801)	863/1956602	0,04%		
Vertrauensbereich		(0,04% - 0,05%)		



Hinweise:
- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

2.3 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet (TKez 521800)

Indikator-ID: 521800

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationären Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24853_521800)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus nicht näher bezeichneter Grad / bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus nicht näher bezeichneter Grad / bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 521800)	115/1956602	0,01%		
Vertrauensbereich		(0,00% - 0,01%)		



Hinweise:
- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

3 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4

Qualitätsziel: Keine neu aufgetretenen Dekubitalulcera Grad/Kategorie 4 bei Patientinnen und Patienten, die ohne Dekubitus Grad/Kategorie 4 aufgenommen wurden oder für die nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

3.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4 (QI-ID 52010)


Indikator-ID: 52010

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24852_52010)

Zähler: Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 4, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Sentinel-Event

	2018		2017	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 52010)	80/1956602	0,00%	89/1969983	0,00%
Vertrauensbereich		(0,00% - 0,01%)		(0,00% - 0,01%)



Hinweise:
- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit