

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 137 SGB V



## **Gesamtauswertung 2019**

### **Modul DEK Dekubitusprophylaxe**

Gesamtauswertung

## Externe vergleichende Qualitätssicherung nach §137 SGB V      ***Dekubitusprophylaxe***

### **Hinweise zur Auswertung**

Seit dem Erfassungsjahr 2013 basiert die Jahresauswertung für das Modul DEK Dekubitusprophylaxe sowohl auf QS-Daten als auch auf Routinedaten (Risikostatistik). Die Daten umfassen alle stationär behandelten Patienten ab einem Alter von 20 Jahren. Seit dem Erfassungsjahr 2018 erfolgt die Erfassung der Risikostatistik fallbezogen.

Mit Aufnahme- und Entlassungsdatum in 2019 wurden insgesamt 24.628 QS-Datensätze geliefert, davon 24.627 fristgerecht (zertifiziert) und auswertbar (fehlerfrei). Als sog. Überlieger, d.h. Aufnahme in 2018 und Entlassung in 2019 wurden 1361 Datensätze einbezogen. Damit fließen in die Auswertung 191 Standorte ein mit insgesamt 25.988 auswertbaren QS-Datensätzen (maximale Fallzahl 805). Die bereinigte Dokumentationsrate (Überdokumentationen wurden nicht berücksichtigt) im Leistungsbereich Dekubitusprophylaxe betrug für Baden-Württemberg 99,56 %. Die Dokumentationsraten einzelner Einrichtungen sind ebenfalls über die Homepage der Geschäftsstelle unter dem Menüpunkt „Aktuelles & Veranstaltungen / Positivliste 2019“ einsehbar.

Eine Risikostatistik wurde insgesamt von 250 Standorten an die Geschäftsstelle übermittelt.

Die Berechnung der Ereignisse für die Qualitätsindikatoren erfolgt auf Basis von plausiblen QS-Datensätzen, d. h. für alle Patienten mit einem Alter von mindestens 20 Jahren und einem Dekubitus ab Grad 2, die im Jahr 2018 oder 2019 aufgenommen und bis zum 31.12.2019 entlassen wurden.

Die Berechnung der Grundgesamtheit für die Qualitätsindikatoren in der Auswertung erfolgt auf Basis der Risikostatistik für alle Patienten mit einem Alter von mindestens 20 Jahren, die im Jahr 2018 oder 2019 aufgenommen und bis zum 31.12.2019 entlassen wurden.

### Aufbau der Einzelauswertung:

Die **Basisstatistik** stellt eine deskriptive Datenauswertung absoluter und relativer Häufigkeiten aller gesammelten Daten aus der Fragensammlung dar, zumeist ohne weitere Verknüpfung.

Im zweiten Teil der Auswertung werden **Qualitätsindikatoren** berechnet, die eine statistische Kennzahl darstellen und noch keine unmittelbare Aussage zur erbrachten Qualität erlauben. Durch Verwendung der Rechenregeln des IQTIG (© 2020 Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, Berlin) entsprechen die dargestellten Qualitätsindikatoren denen der Bundesauswertung, sodass die Möglichkeit zum Vergleich der Ergebnisse mit denen aller Krankenhäuser bundesweit gegeben ist. Angefügt ist des Weiteren eine Aufstellung der bundeseinheitlichen Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren nach aktuellem Kenntnisstand. Damit kann zeitnah mit der „Qualitätsarbeit“ begonnen werden.

Die Beschreibung der einzelnen Qualitätsindikatoren und der jeweilige fachliche Hintergrund können Sie unter dem jeweiligen Leistungsbereich über die Homepage des IQTIG ([www.IQTIG.org](http://www.IQTIG.org)) einsehen.

Die Grundgesamtheit aller Qualitätsindikatoren sowie die Risikoadjustierung des Qualitätsindikators ID 52009 beruhen ausschließlich auf den Daten der Risikostatistik. Diese enthält Angaben von Standorten, die nicht notwendigerweise auch Daten der Qualitätssicherung (QS-Daten) geliefert haben.

Bei der Risikoadjustierung werden die folgenden Risikofaktoren berücksichtigt:

- Adipositas
- Alter
- Beatmungsstunden
- Demenz und Vigilanzstörung
- Diabetes mellitus
- Infektionen
- Inkontinenz
- Eingeschränkte Mobilität
- Untergewicht und Mangelernährung
- Weitere schwere Erkrankungen

Zur Berechnung des Risikoadjustierungsmodells werden die Informationen aus der Risikostatistik mit den QS-Daten verknüpft, um Informationen über die inzidenten Dekubitalulcera zu erhalten. Seit dem Erfassungsjahr 2018 erfolgt die Risikostatistik fallbezogen.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne die Geschäftsstelle der QiG BW GmbH in Stuttgart unter Telefon (07 11) 184278-00.

## Inhalt Gesamtauswertung 2019

*Modul DEK*

*Dekubitusprophylaxe*

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

---

## Inhaltsverzeichnis

### 1 QS-Daten

#### 1.1 Gesamtdaten

1.1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze

1.1.2 Monatsverlauf korrekt übermittelter Datensätze (QS-Daten)

1.1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer (QS-Daten)

#### 1.2 Gradeinteilung des höchstgradigen Dekubitus (QS-Daten)

#### 1.3 Basisdokumentation (QS-Daten)

1.3.1 Verteilung der Altersgruppen (QS-Daten)

1.3.2 Angaben zu Geschlecht und Alter (QS-Daten)

1.3.3 Aufnahmegrund (QS-Daten)

#### 1.4 Risikofaktoren (QS-Daten)

1.4.1 Risikofaktoren

#### 1.5 Dekubitus (QS-Daten)

1.5.1 Wievielter Dekubitus?

1.5.2 War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")

1.5.3 War der Dekubitus bei der Entlassung vorhanden? ("Present on Discharge")

1.5.4 Neu aufgetretene Dekubitalulzera (Dekubitusinzidenz)

#### 1.6 Entlassungsgrund (QS-Daten)

1.6.1 Entlassungsgrund

#### 1.7 QS-Daten

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

### 2 Daten aus der Risikostatistik

#### 2.1 Basisdaten

2.2 Altersverteilung (Daten aus der Risikostatistik)

2.3 Risikofaktoren (Daten aus der Risikostatistik)

## 1 QS-Daten

Hinweis: In der Auswertung wurden nur Datensätze berücksichtigt, die den Status "OK" haben.  
Zu beachten ist, dass sich die Jahresauswertung zusammensetzen aus Fällen mit Aufnahme und Entlassung im Jahr 2019 und ergänzend den sogenannten Überliegern mit (Aufnahme = 2018) und (Entlassung 01.01.2019 bis 31.12.2019).


### 1.1 Gesamtdaten

#### 1.1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze

	2019	2018
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl Krankenhäuser mit QS-Daten	191	196
Davon Anzahl Krankenhäuser mit vorhandener Risikostatistik	191	194
Fallzahl Gesamt	25988	27244
Fallzahl Minimum	1	1
Fallzahl Maximum	805	914
Fallzahl an Überliegern (Aufnahme 2018)	1361	1359

#### 1.1.2 Monatsverlauf korrekt übermittelter Datensätze (QS-Daten)

Anteil der Entlassungen pro Monat im aktuellen Jahr bezogen auf alle gelieferten Datensätze



### 1.1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer (QS-Daten)

Stationäre Aufenthaltsdauer (Tage)		2019	2018
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
<b>Aufenthaltsdauer</b>	<b>(Anzahl)</b>	25988	27244
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	12,0	12,0
Mittelwert	(Tage)	19,1	19,1
Maximum	(Tage)	1008	427

### 1.2 Gradeinteilung des höchstgradigen Dekubitus (QS-Daten)


Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes (Beschränkung auf 4 Stellen)	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
L89.1 Dekubitus 2. Grades	20913/32458	64,4%	22012/34246	64,3%
L89.2 Dekubitus 3. Grades	7369/32458	22,7%	7841/34246	22,9%
L89.3 Dekubitus 4. Grades	3555/32458	11,0%	3817/34246	11,1%
L89.9 Dekubitus n.n.bez.	621/32458	1,9%	576/34246	1,7%

ausführliche Darstellung der Kodes siehe Kapitel 1.7

### 1.3 Basisdokumentation (QS-Daten)

#### 1.3.1 Verteilung der Altersgruppen (QS-Daten)

Verteilung der Altersgruppen	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
20-33 Jahre	204	0,8%	215	0,8%
34-46 Jahre	471	1,8%	531	1,9%
47-54 Jahre	888	3,4%	1039	3,8%
55-61 Jahre	1728	6,6%	1766	6,5%
62-68 Jahre	2644	10,2%	2809	10,3%
69-72 Jahre	2025	7,8%	1945	7,1%
73-76 Jahre	2494	9,6%	2850	10,5%
77-80 Jahre	3962	15,2%	4256	15,6%
81-85 Jahre	5181	19,9%	5132	18,8%
>=86 Jahre	6391	24,6%	6701	24,6%
Gesamt	25988	100,0%	27244	100,0%



### 1.3.2 Angaben zu Geschlecht und Alter (QS-Daten)

Statistische Alterswerte	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>männlich (Anzahl)</b>	13675	52,6%	14235	52,3%
Minimum (Jahre)	20		20	
Median (Jahre)	77,0		77,0	
Mittelwert (Jahre)	74,4		74,0	
Maximum (Jahre)	102		102	
<b>weiblich (Anzahl)</b>	12302	47,3%	13007	47,7%
Minimum (Jahre)	20		20	
Median (Jahre)	81,0		81,0	
Mittelwert (Jahre)	79,0		78,8	
Maximum (Jahre)	105		107	
<b>unbestimmt (Anzahl)</b>	4	0,0%	0	0,0%
Minimum (Jahre)	60		0	
Median (Jahre)	78,5		0,0	
Mittelwert (Jahre)	75,8		0,0	
Maximum (Jahre)	86		0	
<b>unbekannt (Anzahl)</b>	7	0,0%	2	0,0%
Minimum (Jahre)	20		62	
Median (Jahre)	84,0		72,0	
Mittelwert (Jahre)	74,3		72,0	
Maximum (Jahre)	94,0		82,0	
<b>gesamt (Anzahl)</b>	25988	100,0%	27244	100,0%
Minimum (Jahre)	20		20	
Median (Jahre)	79,0		79,0	
Mittelwert (Jahre)	76,6		76,3	
Maximum (Jahre)	105		107	

### 1.3.3 Aufnahmegrund (QS-Daten)

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Krankenhausbehandlung, vollstationär	25505	98,1%	26701	98,0%
Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	476	1,8%	535	2,0%
stationäre Entbindung	4	0,0%	6	0,0%
Geburt	0	0,0%	0	0,0%
Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003	3	0,0%	2	0,0%
stationäre Aufnahme zur Organentnahme	0	0,0%	0	0,0%
<b>Gesamt</b>	<b>25988</b>	<b>100,0%</b>	<b>27244</b>	<b>100,0%</b>

## 1.4 Risikofaktoren (QS-Daten)

### 1.4.1 Risikofaktoren

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Diabetes Mellitus Typ 1 oder 2</b> (gemäß ICD-10-GM: E10.-, E11.-)	8463/25988	32,6%	9234/27244	33,9%
<b>sonstiger Diabetes Mellitus</b> (gemäß ICD-10-GM: E13.-)	193/25988	0,7%	233/27244	0,9%
<b>eingeschränkte Mobilität</b> (gemäß ICD-10-GM: G20.-, G81.-, G82.-, G83.-, M24.5, M62.-, R26.3, R40.-, R46.-, S14.-, S24.-, Z74.0, Z99.3)	14865/25988	57,2%	15329/27244	56,3%
<b>Infektion</b> (gemäß ICD-10-GM: A40.-, A41.-, J15.-, J16.-, J17.-, J18.-, J69.-, M72.6, M86.-, R57.2, R65.-)	8540/25988	32,9%	9006/27244	33,1%
<b>Demenz und Vigilanzstörung</b> (gemäß ICD-10-GM: F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, G30.-)	4687/25988	18,0%	5175/27244	19,0%
<b>Inkontinenz</b> (gemäß ICD-10-GM: N39.-, R15.-, R32.-)	12352/25988	47,5%	13272/27244	48,7%
<b>Untergewicht oder Mangelernährung</b> (gemäß ICD-10-GM: E41.-, E43.-, E44.-, E46.-, R64.-)	2384/25988	9,2%	2646/27244	9,7%
<b>Adipositas</b> (gemäß ICD-10-GM: E66.X2)	571/25988	2,2%	630/27244	2,3%
<b>weitere schwere Erkrankungen</b> (gemäß ICD-10-GM: B37.1, B37.7, D50.-, D51.-, D52.-, D53.-, D61.-, D62.-, D63.-, D64.-, D72.8, G63.2, K70.-, K72.-, K74.-, N17.-, N18.4, N18.5, N99.0, R18, R34, R60.-, R77.0, U69.00, Z99.2)	13767/25988	53,0%	14826/27244	54,4%
<b>Dauer der Beatmung = 0 Stunden</b>	22813/25988	87,8%	23826/27244	87,5%
<b>Dauer der Beatmung &gt;= 1 Stunde</b>	3175/25988	12,2%	3418/27244	12,5%

### 1.4.1 Risikofaktoren

Dauer der Beatmung (>=1 Stunde)		2019	2018
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
		Anzahl	Anzahl
<b>Dauer der Beatmung</b>	<b>(Anzahl)</b>	3175	3418
Minimum	(Stunden)	1	1
Median	(Stunden)	140,0	146,5
Mittelwert	(Stunden)	302,2	297,9
Maximum	(Stunden)	6290	5252

## 1.5 Dekubitus (QS-Daten)

### 1.5.1 Wievielter Dekubitus?

	2019	2018
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
<b>Anzahl</b>	32458	34246
Minimum	1	1
Median	1,0	1,0
Mittelwert	1,3	1,3
Maximum	8	9

### 1.5.2 War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")

POA - Present on Admission	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
(0) Nein: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht vorhanden	7014	21,6%	7332	21,4%
(1) Ja: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus vorhanden	25245	77,8%	26679	77,9%
(9) Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	199	0,6%	235	0,7%
Gesamt	32458	100,0%	34246	100,0%

Dekubitus-Status bei Aufnahme bezieht sich auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Grad

### 1.5.3 War der Dekubitus bei der Entlassung vorhanden? ("Present on Discharge")

POD - Present on Discharge	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
(0) Nein: Diagnose war bei Entlassung aus dem Krankenhaus nicht vorhanden	3871	11,9%	4611	13,5%
(1) Ja: Diagnose war bei Entlassung aus dem Krankenhaus vorhanden	28018	86,3%	29058	84,9%
(9) Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	569	1,8%	577	1,7%
Gesamt	32458	100,0%	34246	100,0%

Dekubitus-Status bei Aufnahme bezieht sich auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Grad

### 1.5.4 Neu aufgetretene Dekubitalulzera (Dekubitusinzidenz)

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 2 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	6096/25988	23,5%	6430/27244	23,6%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 3 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	901/25988	3,5%	924/27244	3,4%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 4 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	87/25988	0,3%	91/27244	0,3%
Stationär erworbener Dekubitus Grad nicht näher bezeichnet bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	129/25988	0,5%	122/27244	0,4%

Stationär erworben bedeutet, dass die Angabe zu POA ("Present on Admission") des höchstgradigen Dekubitus nein oder unbekannt ist

## 1.6 Entlassungsgrund (QS-Daten)

### 1.6.1 Entlassungsgrund

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
01 Behandlung regulär beendet	12538/25988	48,2%	12918/27244	47,4%
02 Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	511/25988	2,0%	562/27244	2,1%
03 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	26/25988	0,1%	30/27244	0,1%
04 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	106/25988	0,4%	92/27244	0,3%
05 Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0/25988	0,0%	0/27244	0,0%
06 Verlegung in ein anderes Krankenhaus	1981/25988	7,6%	2101/27244	7,7%
07 Tod	4420/25988	17,0%	4639/27244	17,0%
08 Verlegung in ein anderes Krankenhaus i. R. e. Zusammenarbeit	30/25988	0,1%	35/27244	0,1%
09 Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	1627/25988	6,3%	1861/27244	6,8%
10 Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	4477/25988	17,2%	4697/27244	17,2%
11 Entlassung in ein Hospiz	120/25988	0,5%	127/27244	0,5%
13 externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	120/25988	0,5%	127/27244	0,5%
14 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	3/25988	0,0%	3/27244	0,0%
15 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	3/25988	0,0%	4/27244	0,0%
17 int. Verleg. mit Wechsel zw. den Entg. ber. der DRG-Fallpauschalen	131/25988	0,5%	147/27244	0,5%
22 Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung	1/25988	0,0%	0/27244	0,0%
25 Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)	0/25988	0,0%	0/27244	0,0%
Gesamt	25988/25988	100,0%	27244/27244	100,0%

## 1.7 QS-Daten

### 1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:

L89.1: Dekubitus 2. Grades

L89.2: Dekubitus 3. Grades

L89.3: Dekubitus 4. Grades

L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus 2. Grades: Kopf	390/32458	1,2%	434/34246	1,3%
Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität	285/32458	0,9%	305/34246	0,9%
Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze	159/32458	0,5%	177/34246	0,5%
Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm	239/32458	0,7%	269/34246	0,8%
Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein	9089/32458	28,0%	9508/34246	27,8%
Dekubitus 2. Grades: Sitzbein	3058/32458	9,4%	3290/34246	9,6%
Dekubitus 2. Grades: Trochanter	913/32458	2,8%	890/34246	2,6%
Dekubitus 2. Grades: Ferse	4188/32458	12,9%	4331/34246	12,6%
Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	1811/32458	5,6%	1903/34246	5,6%
Dekubitus 2. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	781/32458	2,4%	905/34246	2,6%
Dekubitus 3. Grades: Kopf	120/32458	0,4%	109/34246	0,3%
Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität	105/32458	0,3%	103/34246	0,3%
Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze	38/32458	0,1%	41/34246	0,1%
Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm	65/32458	0,2%	72/34246	0,2%
Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein	2378/32458	7,3%	2586/34246	7,6%
Dekubitus 3. Grades: Sitzbein	796/32458	2,5%	682/34246	2,0%
Dekubitus 3. Grades: Trochanter	458/32458	1,4%	416/34246	1,2%
Dekubitus 3. Grades: Ferse	2137/32458	6,6%	2327/34246	6,8%
Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	1030/32458	3,2%	1244/34246	3,6%
Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	242/32458	0,7%	261/34246	0,8%

### 1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:

L89.1: Dekubitus 2. Grades

L89.2: Dekubitus 3. Grades

L89.3: Dekubitus 4. Grades

L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus 4. Grades: Kopf	23/32458	0,1%	22/34246	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität	46/32458	0,1%	40/34246	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze	11/32458	0,0%	8/34246	0,0%
Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm	28/32458	0,1%	33/34246	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein	1378/32458	4,2%	1465/34246	4,3%
Dekubitus 4. Grades: Sitzbein	443/32458	1,4%	482/34246	1,4%
Dekubitus 4. Grades: Trochanter	293/32458	0,9%	292/34246	0,9%
Dekubitus 4. Grades: Ferse	744/32458	2,3%	781/34246	2,3%
Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	502/32458	1,5%	621/34246	1,8%
Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	87/32458	0,3%	73/34246	0,2%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kopf	18/32458	0,1%	10/34246	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Obere Extremität	15/32458	0,0%	23/34246	0,1%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze	2/32458	0,0%	3/34246	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Beckenkamm	13/32458	0,0%	12/34246	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kreuzbein	163/32458	0,5%	162/34246	0,5%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sitzbein	53/32458	0,2%	47/34246	0,1%

### 1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:

L89.1: Dekubitus 2. Grades

L89.2: Dekubitus 3. Grades

L89.3: Dekubitus 4. Grades

L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Trochanter	16/32458	0,0%	14/34246	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Ferse	144/32458	0,4%	124/34246	0,4%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	91/32458	0,3%	91/34246	0,3%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	106/32458	0,3%	90/34246	0,3%

## 1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
100. Innere Medizin A	8172	31,4%	9007	32,0%
102. Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie	175	0,7%	298	1,1%
103. Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie	741	2,9%	845	3,0%
104. Innere Medizin/Schwerpunkt Nephrologie	211	0,8%	250	0,9%
105. Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	236	0,9%	299	1,1%
106. Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrinologie	5	0,0%	11	0,0%
107. Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie	1469	5,7%	1298	4,6%
108. Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie	241	0,9%	194	0,7%
109. Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie	103	0,4%	50	0,2%
114. Innere Medizin/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	1	0,0%	13	0,0%
153. Innere Medizin/Schwerpunkt Diabetes	237	0,9%	386	1,4%
154. Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheilkunde	7	0,0%	4	0,0%
156. Innere Medizin/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	1	0,0%		
190. Innere Medizin B	236	0,9%	235	0,8%
191. Innere Medizin C	4	0,0%	5	0,0%
192. Innere Medizin D	2	0,0%		
200. Geriatrie	173	0,7%	329	1,2%
290. Geriatrie	2	0,0%	1	0,0%
300. Kardiologie	829	3,2%	755	2,7%
400. Nephrologie	83	0,3%	222	0,8%
492. Nephrologie	1	0,0%		
500. Hämatologie und internistische Onkologie	413	1,6%	398	1,4%
600. Endokrinologie	31	0,1%	18	0,1%
700. Gastroenterologie	627	2,4%	732	2,6%
790. Gastroenterologie	1	0,0%		
800. Pneumologie	216	0,8%	210	0,7%
891. Pneumologie	7	0,0%	18	0,1%
1000. Pädiatrie	6	0,0%	8	0,0%

## 1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1500. Allgemeine Chirurgie I	2854	11,0%	2952	10,5%
1516. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie	369	1,4%	390	1,4%
1518. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie	101	0,4%	113	0,4%
1519. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie	8	0,0%	4	0,0%
1520. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie	7	0,0%	8	0,0%
1523. Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie	139	0,5%	88	0,3%
1536. Chirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BpflV am 31.12.2003 geltenden Fassung)	52	0,2%	43	0,2%
1550. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie	106	0,4%	140	0,5%
1551. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Handchirurgie	3	0,0%	31	0,1%
1590. Allgemeine Chirurgie II	24	0,1%	39	0,1%
1591. Allgemeine Chirurgie III	16	0,1%	20	0,1%
1592. Allgemeine Chirurgie IV	2	0,0%	4	0,0%
1600. Unfallchirurgie	1391	5,4%	1589	5,6%
1690. Unfallchirurgie	19	0,1%	34	0,1%
1700. Neurochirurgie	210	0,8%	267	0,9%
1800. Gefäßchirurgie	434	1,7%	522	1,9%
1900. Plastische Chirurgie	194	0,7%	260	0,9%
2000. Thoraxchirurgie	100	0,4%	111	0,4%
2090. Thoraxchirurgie	1	0,0%	1	0,0%
2100. Herzchirurgie	217	0,8%	224	0,8%
2118. Herzchirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie	11	0,0%	15	0,1%
2120. Herzchirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie	1	0,0%		
2200. Urologie	630	2,4%	646	2,3%
2300. Orthopädie	500	1,9%	673	2,4%
2309. Orthopädie/Schwerpunkt Rheumatologie	1	0,0%		
2315. Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie	25	0,1%	30	0,1%
2316. Orthopädie und Unfallchirurgie	11	0,0%	12	0,0%
2390. Orthopädie	203	0,8%	204	0,7%

## 1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
2400. Frauenheilkunde und Geburtshilfe	105	0,4%	149	0,5%
2425. Frauenheilkunde	18	0,1%	11	0,0%
2500. Geburtshilfe	1	0,0%		
2600. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	88	0,3%	104	0,4%
2700. Augenheilkunde	38	0,1%	48	0,2%
2800. Neurologie	1285	4,9%	1338	4,7%
2856. Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	74	0,3%	113	0,4%
2891. Neurologie	14	0,1%	18	0,1%
2900. Allgemeine Psychiatrie	236	0,9%	257	0,9%
2950. Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung	6	0,0%	20	0,1%
2951. Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie	209	0,8%	211	0,7%
3300. Strahlenheilkunde	132	0,5%	107	0,4%
3305. Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	14	0,1%	14	0,0%
3350. Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Radiologie	8	0,0%	14	0,0%
3390. Strahlenheilkunde	6	0,0%	7	0,0%
3400. Dermatologie	194	0,7%	187	0,7%
3500. Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	57	0,2%	50	0,2%
3590. Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	1	0,0%		
3600. Intensivmedizin	783	3,0%	959	3,4%
3601. Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin	49	0,2%	76	0,3%
3603. Intensivmedizin/Schwerpunkt Kardiologie	1	0,0%		
3618. Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie	14	0,1%	27	0,1%
3621. Intensivmedizin/Herzchirurgie	3	0,0%		
3650. Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie	10	0,0%	27	0,1%
3690. Intensivmedizin	23	0,1%	21	0,1%
3700. sonstige Fachabteilung I	463	1,8%	107	0,4%
3752. Palliativmedizin	170	0,7%	182	0,6%
3753. Schmerztherapie	1	0,0%	2	0,0%

## 1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
3755. Wirbelsäulenchirurgie	13	0,1%	20	0,1%
3756. Suchtmedizin	1	0,0%	2	0,0%
3757. Visceralchirurgie	3	0,0%	12	0,0%
3790. Sonstige Fachabteilung II	68	0,3%	69	0,2%
9900. sonstige Fachabteilung	41	0,2%		

## 2 Daten aus der Risikostatistik

### 2.1 Basisdaten

Angaben über Krankenhäuser mit Risikostatistik	2019	2018
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl Krankenhäuser mit Risikostatistik	250	253
Davon Anzahl Krankenhäuser mit Patienten mit Dekubitus ab Grad 2 vorhanden	192	194
Davon Anzahl Krankenhäuser mit erfolgter QS-Dokumentation	191	196

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Patienten mit Dekubitus</b>	26107/1955475	1,3%	27255/1956602	1,4%
Grad 2 (L89.1)	16668/26107	63,8%	17375/27255	63,7%
Grad 3 (L89.2)	5956/26107	22,8%	6217/27255	22,8%
Grad 4 (L89.3)	3063/26107	11,7%	3302/27255	12,1%
Grad n.n.bez. (L89.9)	558/26107	2,1%	487/27255	1,8%

## 2.2 Altersverteilung (Daten aus der Risikostatistik)

Altersverteilung - Patienten gesamt	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Patienten gesamt</b>	1955475/1955475	100,0%	1956602/1956602	100,0%
20-33 Jahre	250561/1955475	12,8%	254976/1956602	13,0%
34-46 Jahre	223258/1955475	11,4%	226032/1956602	11,6%
47-54 Jahre	189760/1955475	9,7%	198823/1956602	10,2%
55-61 Jahre	221577/1955475	11,3%	217711/1956602	11,1%
62-68 Jahre	230374/1955475	11,8%	227698/1956602	11,6%
69-72 Jahre	141264/1955475	7,2%	129386/1956602	6,6%
73-76 Jahre	139717/1955475	7,1%	154210/1956602	7,9%
77-80 Jahre	195593/1955475	10,0%	198028/1956602	10,1%
81-85 Jahre	200044/1955475	10,2%	187388/1956602	9,6%
>= 86 Jahre	163265/1955475	8,3%	162350/1956602	8,3%

Statistische Alterswerte	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>gesamt</b> (Anzahl)	1955475		1956602	
Minimum (Jahre)	0		20	
Median (Jahre)	64,0		64,0	
Mittelwert (Jahre)	61,4		61,2	
Maximum (Jahre)	119		118	

Altersverteilung - Patienten mit Dekubitus	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Patienten gesamt</b>	26107/1955475	1,3%	27255/1956602	1,4%
20-33 Jahre	206/26107	0,8%	216/27255	0,8%
34-46 Jahre	486/26107	1,9%	525/27255	1,9%
47-54 Jahre	913/26107	3,5%	1041/27255	3,8%
55-61 Jahre	1758/26107	6,7%	1777/27255	6,5%
62-68 Jahre	2649/26107	10,1%	2814/27255	10,3%
69-72 Jahre	2033/26107	7,8%	1953/27255	7,2%
73-76 Jahre	2515/26107	9,6%	2846/27255	10,4%
77-80 Jahre	3956/26107	15,2%	4259/27255	15,6%
81-85 Jahre	5184/26107	19,9%	5129/27255	18,8%
>= 86 Jahre	6407/26107	24,5%	6695/27255	24,6%

Statistische Alterswerte (Patienten mit Dekubitus)	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>gesamt</b> (Anzahl)	26107		27255	
Minimum (Jahre)	20		20	
Median (Jahre)	79,0		79,0	
Mittelwert (Jahre)	76,5		76,3	
Maximum (Jahre)	105		107	

### 2.3 Risikofaktoren (Daten aus der Risikostatistik)

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Diabetes mellitus	312748/1955475	16,0%	310473/1956602	15,9%
Dauer der Beatmung 25 bis 72 Stunden	9483/1955475	0,5%	9394/1956602	0,5%
Dauer der Beatmung 73 bis 240 Stunden	8513/1955475	0,4%	8758/1956602	0,4%
Dauer der Beatmung über 240 Stunden	5992/1955475	0,3%	6363/1956602	0,3%
eingeschränkte Mobilität	271781/1955475	13,9%	263683/1956602	13,5%
Infektion	118640/1955475	6,1%	117252/1956602	6,0%
Demenz und Vigilanzstörung	77636/1955475	4,0%	79627/1956602	4,1%
Untergewicht und Mangelernährung	36563/1955475	1,9%	35904/1956602	1,8%
Inkontinenz	196772/1955475	10,1%	200872/1956602	10,3%
Adipositas	29876/1955475	1,5%	29588/1956602	1,5%
weitere schwere Erkrankungen	329822/1955475	16,9%	320337/1956602	16,4%

Dauer der Beatmung		2019	2018
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
		Anzahl	Anzahl
<b>gesamt</b>	<b>(Anzahl)</b>	42807	43300
Minimum	(Stunden)	1	1
Median	(Stunden)	31,0	32,0
Mittelwert	(Stunden)	117,0	121,1
Maximum	(Stunden)	6290	5252

## Inhalt Gesamtauswertung 2019

*Modul DEK*

*Dekubitusprophylaxe*

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

---

## Inhaltsverzeichnis

### **1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)**

1.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.3 Risikofaktoren zum verwendeten Dekubitus-Score für QI-ID 50009 © IQTIG 2020

### **2 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)**

2.1 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2 (TKez 52326)

2.2 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3 (TKez 521801)

2.3 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet (TKez 521800)

### **3 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4**

3.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4 (QI-ID 52010)

## 1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

Qualitätsziel: Möglichst wenig neu aufgetretene Dekubitalulcera Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad/bezeichneter Kategorie bei Patientinnen und Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden oder für die nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

### 1.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)


Indikator-ID: 52008

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik

Zähler: Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert; Kennzahl zum nachfolgenden Qualitätsindikator

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1) (ID 52008)	6409/1955475	0,33%	6707/1956602	0,34%
Vertrauensbereich		(0,32% - 0,34%)		(0,33% - 0,35%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit  $\geq 20$  Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

## 1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

### Indikator-ID: 52009

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik

Zähler: Patientinnen und Patienten mit Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad / bezeichneter Kategorie, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: <= 2,13 (95. Perzentil)

Kalkulatorische Kennzahlen	2019	2018
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
beobachtet (O) °	6409	6707
O_52009	0,33%	0,34%
vorhergesagt (E) *	6.921,97	6.862,37
E_52009	0,35%	0,35%
Gesamt	1955475	1956602
O - E *	-0,03%	-0,01%

° Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand.

\* Erwartete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, risikoadjustiert nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009.

Der Zähler der kalkulatorischen Kennzahl mit der Kennzahl-ID E\_52009 wird durch die kalkulatorische Kennzahl mit der Kennzahl-ID 23014\_52009 berechnet und bildet den Score zur logistischen Regression für den Indikator mit der QI-ID 52009 ab.

Der Nenner der kalkulatorischen Kennzahl mit der Kennzahl-ID E\_52009 wird durch die kalkulatorische Kennzahl mit der Kennzahl-ID 24851\_52009 berechnet und bildet alle vollstationären Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik ab.

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
O / E ** (ID 52009)	0,93		0,98	
Vertrauensbereich		(0,90 - 0,95)		(0,95 - 1,00)

\*\* Verhältnis der beobachteten Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, zur erwarteten Rate.


Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, kleiner ist als erwartet und umgekehrt.

Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, ist 20% größer als erwartet.

O / E = 0,9 Die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, ist 10% kleiner als erwartet.

**1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)**



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit  $\geq 20$  Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

### 1.3 Risikofaktoren zum verwendeten Dekubitus-Score für QI-ID 50009 © IQTIG 2020

#### Risikofaktoren

Referenzwahrscheinlichkeit: 0,017 % (Odds: 0,000)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-8,690007392593012	0,036	-241,640	-	-
Alter (linear zwischen 31 und 97 Jahren)	0,090244136846490	0,003	26,228	1,094	1,087 - 1,102
Alter (quadratisch zwischen 31 und 97 Jahren)	-0,001410514758855	0,000	-13,475	0,999	0,998 - 0,999
Alter (kubisch zwischen 31 und 97 Jahren)	0,000009364890709	0,000	9,651	1,000	1,000 - 1,000
Dauer der Beatmung 24 bis 71 Stunden	0,886810346484583	0,024	36,819	2,427	2,315 - 2,545
Dauer der Beatmung 72 bis 239 Stunden	1,319522263073722	0,019	69,569	3,742	3,605 - 3,883
Dauer der Beatmung ab 240 Stunden	2,208658520402705	0,014	152,597	9,103	8,849 - 9,365
Diabetes Mellitus	0,153412939317293	0,009	17,363	1,166	1,146 - 1,186
Eingeschränkte Mobilität	0,756747276339805	0,009	84,588	2,131	2,094 - 2,169
Infektion	0,717690959643532	0,010	71,473	2,050	2,010 - 2,090
Demenz und Vigilanzstörung	0,103990120042886	0,012	8,395	1,110	1,083 - 1,137
Inkontinenz	0,728122976315701	0,009	79,154	2,071	2,034 - 2,109
Untergewicht und Mangelernährung	0,680188918920693	0,013	53,719	1,974	1,926 - 2,024
Adipositas	0,111415805930087	0,026	4,228	1,118	1,062 - 1,177
Weitere schwere Erkrankungen	1,335281222420371	0,009	141,610	3,801	3,731 - 3,872

## 2 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

### 2.1 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2 (TKez 52326)


Indikator-ID: 52326

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24854\_52326)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 52326)	5607/1955475	0,29%	5872/1956602	0,30%
Vertrauensbereich		(0,28% - 0,29%)		(0,29% - 0,31%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit  $\geq 20$  Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

## 2.2 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3 (TKez 521801)


Indikator-ID: 521801

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24855\_521801)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 3, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 3, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 521801)	828/1955475	0,04%	863/1956602	0,04%
Vertrauensbereich		(0,04% - 0,05%)		(0,04% - 0,05%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

### 2.3 Transparenzkennzahl: Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet (TKez 521800)


**Indikator-ID: 521800**

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24853\_521800)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus nicht näher bezeichneter Grad / bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus nicht näher bezeichneter Grad / bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 521800)	121/1955475	0,01%	115/1956602	0,01%
Vertrauensbereich		(0,01% - 0,01%)		(0,00% - 0,01%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit  $\geq 20$  Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

### 3 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4

Qualitätsziel: Keine neu aufgetretenen Dekubitalulcera Grad/Kategorie 4 bei Patientinnen und Patienten, die ohne Dekubitus Grad/Kategorie 4 aufgenommen wurden oder für die nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

#### 3.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4 (QI-ID 52010)


##### Indikator-ID: 52010

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24852\_52010)

Zähler: Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 4, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Sentinel-Event

	2019		2018	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 4, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 52010)	77/1955475	0,00%	80/1956602	0,00%
Vertrauensbereich		(0,00% - 0,00%)		(0,00% - 0,01%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit  $\geq 20$  Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit