

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 136 SGB V



Gesamtauswertung 2020

Modul DEK Dekubitusprophylaxe

Gesamtauswertung

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach §136 SGB V ***Dekubitusprophylaxe***

Hinweise zur Auswertung

Seit dem Erfassungsjahr 2013 basiert die Jahresauswertung für das Modul DEK Dekubitusprophylaxe sowohl auf QS-Daten als auch auf Routinedaten (Risikostatistik). Die Daten umfassen alle stationär behandelten Patienten ab einem Alter von 20 Jahren. Seit dem Erfassungsjahr 2018 erfolgt die Erfassung der Risikostatistik fallbezogen.

Mit Aufnahme- und Entlassungsdatum in 2020 wurden insgesamt 22.988 QS-Datensätze fristgerecht (zertifiziert) und auswertbar (fehlerfrei) geliefert.

Aufgrund einer Spezifikationsänderung (Anpassung des Risikostatistik-Filters) zum Erfassungsjahr 2020 werden die Überlieger bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse für das Jahr 2020 sind mit den Ergebnissen für das Jahr 2019 eingeschränkt vergleichbar.

Die Berechnung der Ereignisse für die Qualitätsindikatoren erfolgt damit auf Basis von plausiblen QS-Datensätzen, d. h. für alle Patienten mit einem Alter von mindestens 20 Jahren und einem Dekubitus ab Grad 2, die im Jahr 2020 aufgenommen und entlassen wurden.

Die Berechnung der Grundgesamtheit für die Qualitätsindikatoren in der Auswertung erfolgt auf Basis der Risikostatistik für alle Patienten mit einem Alter von mindestens 20 Jahren, die im Jahr 2020 aufgenommen und entlassen wurden.

Eine Risikostatistik wurde insgesamt von 246 Standorten an die Geschäftsstelle übermittelt.

Aufbau der Einzelauswertung:

Die **Basisstatistik** stellt eine deskriptive Datenauswertung absoluter und relativer Häufigkeiten aller gesammelten Daten aus der Fragensammlung dar, zumeist ohne weitere Verknüpfung.

Im zweiten Teil der Auswertung werden **Qualitätsindikatoren** berechnet, die eine statistische Kennzahl darstellen und noch keine unmittelbare Aussage zur erbrachten Qualität erlauben. Durch Verwendung der Rechenregeln des IQTIG (© 2021 Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, Berlin) entsprechen die dargestellten Qualitätsindikatoren denen der Bundesauswertung, sodass die Möglichkeit zum Vergleich der Ergebnisse mit denen aller Krankenhäuser bundesweit gegeben ist. Angefügt ist des Weiteren eine Aufstellung der bundeseinheitlichen Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren nach aktuellem Kenntnisstand. Damit kann zeitnah mit der „Qualitätsarbeit“ begonnen werden.

Die Beschreibung der einzelnen Qualitätsindikatoren und der jeweilige fachliche Hintergrund können Sie unter dem jeweiligen Leistungsbereich über die Homepage des IQTIG (www.IQTIG.org) einsehen.

Die Grundgesamtheit aller Qualitätsindikatoren sowie die Risikoadjustierung des Qualitätsindikators ID 52009 beruhen ausschließlich auf den Daten der Risikostatistik. Diese enthält Angaben von Standorten, die nicht notwendigerweise auch Daten der Qualitätssicherung (QS-Daten) geliefert haben.

Bei der Risikoadjustierung werden die folgenden Risikofaktoren berücksichtigt:

- Adipositas
- Alter
- Beatmungsstunden
- Demenz und Vigilanzstörung
- Diabetes mellitus
- Infektionen
- Inkontinenz
- Eingeschränkte Mobilität
- Untergewicht und Mangelernährung
- Weitere schwere Erkrankungen

Zur Berechnung des Risikoadjustierungsmodells werden die Informationen aus der Risikostatistik mit den QS-Daten verknüpft, um Informationen über die inzidenten Dekubitalulcera zu erhalten.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne die Geschäftsstelle der QiG BW GmbH in Stuttgart unter Telefon (07 11) 184278-00.

Inhalt Gesamtauswertung 2020

Modul DEK

Dekubitusprophylaxe

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 QS-Daten

1.1 Gesamtdaten

1.1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze

1.1.2 Monatsverlauf korrekt übermittelter Datensätze (QS-Daten)

1.1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer (QS-Daten)

1.2 Gradeinteilung des höchstgradigen Dekubitus (QS-Daten)

1.3 Basisdokumentation (QS-Daten)

1.3.1 Verteilung der Altersgruppen (QS-Daten)

1.3.2 Angaben zu Geschlecht und Alter (QS-Daten)

1.3.3 Aufnahmegrund (QS-Daten)

1.4 Risikofaktoren (QS-Daten)

1.4.1 Risikofaktoren

1.5 Dekubitus (QS-Daten)

1.5.1 Wievielter Dekubitus?

1.5.2 War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")

1.5.3 War der Dekubitus bei der Entlassung vorhanden? ("Present on Discharge")

1.5.4 Neu aufgetretene Dekubitalulzera (Dekubitusinzidenz)

1.6 Entlassungsgrund (QS-Daten)

1.6.1 Entlassungsgrund

1.7 QS-Daten

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

2 Daten aus der Risikostatistik

2.1 Basisdaten

2.2 Altersverteilung (Daten aus der Risikostatistik)

2.3 Risikofaktoren (Daten aus der Risikostatistik)

1 QS-Daten

Hinweis: Zu beachten ist, dass sich die Jahresauswertung 2020 lediglich aus Fällen mit Aufnahme und Entlassung im Jahr 2020 zusammensetzt. Aufgrund einer Spezifikationsänderung (Anpassung des Risikostatistik-Filters) zum Erfassungsjahr 2020 werden die Überlieger (Aufnahme 2019 und Entlassung 2020) bei den Berechnungen **nicht** berücksichtigt.


1.1 Gesamtdaten

1.1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze

	2020	2019
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl Krankenhäuser mit QS-Daten	198	191
Davon Anzahl Krankenhäuser mit vorhandener Risikostatistik	198	191
Fallzahl Gesamt	22988	25988
Fallzahl Minimum	1	1
Fallzahl Maximum	708	805

1.1.2 Monatsverlauf korrekt übermittelter Datensätze (QS-Daten)

Anteil der Entlassungen pro Monat im aktuellen Jahr bezogen auf alle gelieferten Datensätze



1.1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer (QS-Daten)

Stationäre Aufenthaltsdauer (Tage)		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Aufenthaltsdauer	(Anzahl)	22988	25988
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	12,0	12,0
Mittelwert	(Tage)	17,9	19,1
Maximum	(Tage)	332	1008

1.2 Gradeinteilung des höchstgradigen Dekubitus (QS-Daten)


Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes (Beschränkung auf 4 Stellen)	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
L89.1 Dekubitus 2. Grades	18661/28890	64,6%	20913/32458	64,4%
L89.2 Dekubitus 3. Grades	6508/28890	22,5%	7369/32458	22,7%
L89.3 Dekubitus 4. Grades	3026/28890	10,5%	3555/32458	11,0%
L89.9 Dekubitus n.n.bez.	695/28890	2,4%	621/32458	1,9%

ausführliche Darstellung der Kodes siehe Kapitel 1.7

1.3 Basisdokumentation (QS-Daten)

1.3.1 Verteilung der Altersgruppen (QS-Daten)

Verteilung der Altersgruppen	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
20-33 Jahre	134	0,6%	204	0,8%
34-46 Jahre	380	1,7%	471	1,8%
47-54 Jahre	757	3,3%	888	3,4%
55-61 Jahre	1572	6,8%	1728	6,6%
62-68 Jahre	2468	10,7%	2644	10,2%
69-72 Jahre	1845	8,0%	2025	7,8%
73-76 Jahre	2109	9,2%	2494	9,6%
77-80 Jahre	3412	14,8%	3962	15,2%
81-85 Jahre	4847	21,1%	5181	19,9%
>=86 Jahre	5464	23,8%	6391	24,6%
Gesamt	22988	100,0%	25988	100,0%



1.3.2 Angaben zu Geschlecht und Alter (QS-Daten)

Statistische Alterswerte		2020		2019	
		Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
		Anzahl	%	Anzahl	%
männlich	(Anzahl)	12432	54,1%	13675	52,6%
Minimum	(Jahre)	20		20	
Median	(Jahre)	77,0		77,0	
Mittelwert	(Jahre)	74,6		74,4	
Maximum	(Jahre)	102		102	
weiblich	(Anzahl)	10554	45,9%	12302	47,3%
Minimum	(Jahre)	20		20	
Median	(Jahre)	81,0		81,0	
Mittelwert	(Jahre)	78,9		79,0	
Maximum	(Jahre)	106		105	
divers	(Anzahl)	0	0,0%		
Minimum	(Jahre)	0			
Median	(Jahre)	0,0			
Mittelwert	(Jahre)	0,0			
Maximum	(Jahre)	0			
unbestimmt	(Anzahl)	1	0,0%	4	0,0%
Minimum	(Jahre)	64		60	
Median	(Jahre)	64,0		78,5	
Mittelwert	(Jahre)	64,0		75,8	
Maximum	(Jahre)	64		86	
unbekannt	(Anzahl)	1	0,0%	7	0,0%
Minimum	(Jahre)	66		20	
Median	(Jahre)	66,0		84,0	
Mittelwert	(Jahre)	66,0		74,3	
Maximum	(Jahre)	66,0		94,0	
gesamt	(Anzahl)	22988	100,0%	25988	100,0%
Minimum	(Jahre)	20		20	
Median	(Jahre)	79,0		79,0	
Mittelwert	(Jahre)	76,6		76,6	
Maximum	(Jahre)	106		105	

1.3.3 Aufnahmegrund (QS-Daten)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Krankenhausbehandlung, vollstationär	22513	97,9%	25505	98,1%
Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung	469	2,0%	476	1,8%
stationäre Entbindung	5	0,0%	4	0,0%
Geburt	0	0,0%	0	0,0%
Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003	1	0,0%	3	0,0%
stationäre Aufnahme zur Organentnahme	0	0,0%	0	0,0%
Gesamt	22988	100,0%	25988	100,0%

1.4 Risikofaktoren (QS-Daten)

1.4.1 Risikofaktoren

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Diabetes Mellitus Typ 1 oder 2 (gemäß ICD-10-GM: E10.-, E11.-)	7821/22988	34,0%	8463/25988	32,6%
sonstiger Diabetes Mellitus (gemäß ICD-10-GM: E13.-)	149/22988	0,6%	193/25988	0,7%
eingeschränkte Mobilität (gemäß ICD-10-GM: G20.-, G81.-, G82.-, G83.-, M24.5, M62.-, R26.3, R40.-, R46.-, S14.-, S24.-, Z74.0, Z99.3)	13099/22988	57,0%	14865/25988	57,2%
Infektion (gemäß ICD-10-GM: A40.-, A41.-, J15.-, J16.-, J17.-, J18.-, J69.-, M72.6, M86.-, R57.2, R65.-)	7457/22988	32,4%	8540/25988	32,9%
Demenz und Vigilanzstörung (gemäß ICD-10-GM: F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, G30.-)	4107/22988	17,9%	4687/25988	18,0%
Inkontinenz (gemäß ICD-10-GM: N39.-, R15.-, R32.-)	11050/22988	48,1%	12352/25988	47,5%
Untergewicht oder Mangelernährung (gemäß ICD-10-GM: E41.-, E43.-, E44.-, E46.-, R64.-)	2191/22988	9,5%	2384/25988	9,2%
Adipositas (gemäß ICD-10-GM: E66.02, E66.12, E66.22, E66.82, E66.92)	469/22988	2,0%	571/25988	2,2%
weitere schwere Erkrankungen (gemäß ICD-10-GM: B37.1, B37.7, D50.-, D51.-, D52.-, D53.-, D61.-, D62.-, D63.-, D64.-, D72.8, G63.2, K70.-, K72.-, K74.-, N17.-, N18.4, N18.5, N99.0, R18, R34, R60.-, R77.0, U69.01, U69.02, U69.03, Z99.2)	12772/22988	55,6%	13767/25988	53,0%
Dauer der Beatmung = 0 Stunden	20181/22988	87,8%	22813/25988	87,8%
Dauer der Beatmung >= 1 Stunde	2807/22988	12,2%	3175/25988	12,2%

1.4.1 Risikofaktoren

Dauer der Beatmung (>=1 Stunde)		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
		Anzahl	Anzahl
Dauer der Beatmung	(Anzahl)	2807	3175
Minimum	(Stunden)	1	1
Median	(Stunden)	157,0	140,0
Mittelwert	(Stunden)	289,0	302,2
Maximum	(Stunden)	3333	6290

1.5 Dekubitus (QS-Daten)

1.5.1 Wievielter Dekubitus?

	2020	2019
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl	28890	32458
Minimum	1	1
Median	1,0	1,0
Mittelwert	1,3	1,3
Maximum	13	8

1.5.2 War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission")

POA - Present on Admission	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
(0) Nein: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht vorhanden	6585	22,8%	7014	21,6%
(1) Ja: Diagnose war bei Aufnahme ins Krankenhaus vorhanden	22082	76,4%	25245	77,8%
(9) Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	223	0,8%	199	0,6%
Gesamt	28890	100,0%	32458	100,0%

Dekubitus-Status bei Aufnahme bezieht sich auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Grad

1.5.3 War der Dekubitus bei der Entlassung vorhanden? ("Present on Discharge")

POD - Present on Discharge	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
(0) Nein: Diagnose war bei Entlassung aus dem Krankenhaus nicht vorhanden	3286	11,4%	3871	11,9%
(1) Ja: Diagnose war bei Entlassung aus dem Krankenhaus vorhanden	25080	86,8%	28018	86,3%
(9) Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation	524	1,8%	569	1,8%
Gesamt	28890	100,0%	32458	100,0%

Dekubitus-Status bei Aufnahme bezieht sich auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Grad

1.5.4 Neu aufgetretene Dekubitalulzera (Dekubitusinzidenz)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 2 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	5763/22988	25,1%	6096/25988	23,5%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 3 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	828/22988	3,6%	901/25988	3,5%
Stationär erworbener Dekubitus Grad 4 bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	68/22988	0,3%	87/25988	0,3%
Stationär erworbener Dekubitus Grad nicht näher bezeichnet bei Patienten ohne DEK bei Aufnahme	149/22988	0,6%	129/25988	0,5%

Stationär erworben bedeutet, dass die Angabe zu POA ("Present on Admission") des höchstgradigen Dekubitus nein oder unbekannt ist

1.6 Entlassungsgrund (QS-Daten)

1.6.1 Entlassungsgrund

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
01 Behandlung regulär beendet	11068/22988	48,1%	12538/25988	48,2%
02 Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	457/22988	2,0%	511/25988	2,0%
03 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	40/22988	0,2%	26/25988	0,1%
04 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	115/22988	0,5%	106/25988	0,4%
05 Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0/22988	0,0%	0/25988	0,0%
06 Verlegung in ein anderes Krankenhaus	1707/22988	7,4%	1981/25988	7,6%
07 Tod	4057/22988	17,6%	4420/25988	17,0%
08 Verlegung in ein anderes Krankenhaus i. R. e. Zusammenarbeit	21/22988	0,1%	30/25988	0,1%
09 Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	1495/22988	6,5%	1627/25988	6,3%
10 Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	3745/22988	16,3%	4477/25988	17,2%
11 Entlassung in ein Hospiz	92/22988	0,4%	120/25988	0,5%
13 externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	17/22988	0,1%	120/25988	0,5%
14 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0/22988	0,0%	3/25988	0,0%
15 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	2/22988	0,0%	3/25988	0,0%
17 int. Verleg. mit Wechsel zw. den Entg. ber. der DRG-Fallpauschalen	153/22988	0,7%	131/25988	0,5%
22 Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	7/22988	0,0%	1/25988	0,0%
25 Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)	0/22988	0,0%	0/25988	0,0%
28 Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	9/22988	0,0%		
29 Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	3/22988	0,0%		
Gesamt	22988/22988	100,0%	25988/25988	100,0%

1.7 QS-Daten

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:

L89.1: Dekubitus 2. Grades

L89.2: Dekubitus 3. Grades

L89.3: Dekubitus 4. Grades

L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus 2. Grades: Kopf	432/28890	1,5%	390/32458	1,2%
Dekubitus 2. Grades: Obere Extremität	302/28890	1,0%	285/32458	0,9%
Dekubitus 2. Grades: Dornfortsätze	143/28890	0,5%	159/32458	0,5%
Dekubitus 2. Grades: Beckenkamm	187/28890	0,6%	239/32458	0,7%
Dekubitus 2. Grades: Kreuzbein	8253/28890	28,6%	9089/32458	28,0%
Dekubitus 2. Grades: Sitzbein	2756/28890	9,5%	3058/32458	9,4%
Dekubitus 2. Grades: Trochanter	730/28890	2,5%	913/32458	2,8%
Dekubitus 2. Grades: Ferse	3647/28890	12,6%	4188/32458	12,9%
Dekubitus 2. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	1507/28890	5,2%	1811/32458	5,6%
Dekubitus 2. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	704/28890	2,4%	781/32458	2,4%
Dekubitus 3. Grades: Kopf	123/28890	0,4%	120/32458	0,4%
Dekubitus 3. Grades: Obere Extremität	98/28890	0,3%	105/32458	0,3%
Dekubitus 3. Grades: Dornfortsätze	50/28890	0,2%	38/32458	0,1%
Dekubitus 3. Grades: Beckenkamm	66/28890	0,2%	65/32458	0,2%
Dekubitus 3. Grades: Kreuzbein	2140/28890	7,4%	2378/32458	7,3%
Dekubitus 3. Grades: Sitzbein	584/28890	2,0%	796/32458	2,5%
Dekubitus 3. Grades: Trochanter	317/28890	1,1%	458/32458	1,4%
Dekubitus 3. Grades: Ferse	1946/28890	6,7%	2137/32458	6,6%
Dekubitus 3. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	950/28890	3,3%	1030/32458	3,2%
Dekubitus 3. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	234/28890	0,8%	242/32458	0,7%

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:

L89.1: Dekubitus 2. Grades

L89.2: Dekubitus 3. Grades

L89.3: Dekubitus 4. Grades

L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus 4. Grades: Kopf	21/28890	0,1%	23/32458	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Obere Extremität	25/28890	0,1%	46/32458	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Dornfortsätze	14/28890	0,0%	11/32458	0,0%
Dekubitus 4. Grades: Beckenkamm	37/28890	0,1%	28/32458	0,1%
Dekubitus 4. Grades: Kreuzbein	1197/28890	4,1%	1378/32458	4,2%
Dekubitus 4. Grades: Sitzbein	346/28890	1,2%	443/32458	1,4%
Dekubitus 4. Grades: Trochanter	225/28890	0,8%	293/32458	0,9%
Dekubitus 4. Grades: Ferse	635/28890	2,2%	744/32458	2,3%
Dekubitus 4. Grades: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	446/28890	1,5%	502/32458	1,5%
Dekubitus 4. Grades: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	80/28890	0,3%	87/32458	0,3%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kopf	34/28890	0,1%	18/32458	0,1%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Obere Extremität	17/28890	0,1%	15/32458	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze	7/28890	0,0%	2/32458	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Beckenkamm	9/28890	0,0%	13/32458	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Kreuzbein	172/28890	0,6%	163/32458	0,5%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sitzbein	41/28890	0,1%	53/32458	0,2%

1.7.1 Gradeinteilung und Lokalisation des Dekubitus: Dokumentationspflichtige ICD-L89-Kodes

Gradeinteilung des Dekubitus:

L89.1: Dekubitus 2. Grades

L89.2: Dekubitus 3. Grades

L89.3: Dekubitus 4. Grades

L89.9: Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Trochanter	21/28890	0,1%	16/32458	0,0%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Ferse	145/28890	0,5%	144/32458	0,4%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität	117/28890	0,4%	91/32458	0,3%
Dekubitus, Grad nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen	132/28890	0,5%	106/32458	0,3%

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
100. Innere Medizin A	5861	25,5%	8172	31,4%
102. Innere Medizin/Schwerpunkt Geriatrie	218	0,9%	175	0,7%
103. Innere Medizin/Schwerpunkt Kardiologie	1169	5,1%	741	2,9%
104. Innere Medizin/Schwerpunkt Nephrologie	234	1,0%	211	0,8%
105. Innere Medizin/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	278	1,2%	236	0,9%
106. Innere Medizin/Schwerpunkt Endokrinologie	6	0,0%	5	0,0%
107. Innere Medizin/Schwerpunkt Gastroenterologie	1661	7,2%	1469	5,7%
108. Innere Medizin/Schwerpunkt Pneumologie	340	1,5%	241	0,9%
109. Innere Medizin/Schwerpunkt Rheumatologie	75	0,3%	103	0,4%
114. Innere Medizin/Schwerpunkt Lungen- und Bronchialheilkunde	70	0,3%	1	0,0%
153. Innere Medizin/Schwerpunkt Diabetes	236	1,0%	237	0,9%
154. Innere Medizin/Schwerpunkt Naturheilkunde	7	0,0%	7	0,0%
156. Innere Medizin/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	2	0,0%	1	0,0%
190. Innere Medizin B	360	1,6%	236	0,9%
191. Innere Medizin C	64	0,3%	4	0,0%
200. Geriatrie	128	0,6%	173	0,7%
300. Kardiologie	666	2,9%	829	3,2%
400. Nephrologie	45	0,2%	83	0,3%
500. Hämatologie und internistische Onkologie	344	1,5%	413	1,6%
600. Endokrinologie	28	0,1%	31	0,1%
700. Gastroenterologie	632	2,7%	627	2,4%
800. Pneumologie	138	0,6%	216	0,8%
891. Pneumologie	5	0,0%	7	0,0%
1000. Pädiatrie	8	0,0%	6	0,0%
1011. Pädiatrie/Schwerpunkt Kinderkardiologie	2	0,0%		
1500. Allgemeine Chirurgie I	1980	8,6%	2854	11,0%
1516. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Unfallchirurgie	469	2,0%	369	1,4%

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1518. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie	123	0,5%	101	0,4%
1519. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Plastische Chirurgie	1	0,0%	8	0,0%
1520. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Thoraxchirurgie	28	0,1%	7	0,0%
1523. Chirurgie/Schwerpunkt Orthopädie	128	0,6%	139	0,5%
1536. Chirurgie/Intensivmedizin (§ 13 Abs. 2 Satz 3 2. Halbsatz BpflV am 31.12.2003 geltenden Fassung)	26	0,1%	52	0,2%
1550. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Abdominal- und Gefäßchirurgie	95	0,4%	106	0,4%
1551. Allgemeine Chirurgie/Schwerpunkt Handchirurgie	4	0,0%	3	0,0%
1590. Allgemeine Chirurgie II	122	0,5%	24	0,1%
1591. Allgemeine Chirurgie III	53	0,2%	16	0,1%
1592. Allgemeine Chirurgie IV	6	0,0%	2	0,0%
1600. Unfallchirurgie	1249	5,4%	1391	5,4%
1690. Unfallchirurgie	27	0,1%	19	0,1%
1700. Neurochirurgie	189	0,8%	210	0,8%
1800. Gefäßchirurgie	422	1,8%	434	1,7%
1900. Plastische Chirurgie	165	0,7%	194	0,7%
2000. Thoraxchirurgie	48	0,2%	100	0,4%
2100. Herzchirurgie	146	0,6%	217	0,8%
2118. Herzchirurgie/Schwerpunkt Gefäßchirurgie	8	0,0%	11	0,0%
2200. Urologie	562	2,4%	630	2,4%
2290. Urologie	8	0,0%		
2300. Orthopädie	369	1,6%	500	1,9%
2315. Orthopädie/Schwerpunkt Chirurgie	19	0,1%	25	0,1%
2316. Orthopädie und Unfallchirurgie	9	0,0%	11	0,0%
2390. Orthopädie	122	0,5%	203	0,8%
2400. Frauenheilkunde und Geburtshilfe	107	0,5%	105	0,4%
2425. Frauenheilkunde	15	0,1%	18	0,1%
2490. Frauenheilkunde und Geburtshilfe	2	0,0%		

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
2600. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	69	0,3%	88	0,3%
2700. Augenheilkunde	34	0,1%	38	0,1%
2800. Neurologie	1177	5,1%	1285	4,9%
2856. Neurologie/Schwerpunkt Schlaganfallpatienten (Stroke units, Artikel 7 § 1 Abs. 3 GKV-SolG)	39	0,2%	74	0,3%
2890. Neurologie	1	0,0%		
2891. Neurologie	6	0,0%	14	0,1%
2900. Allgemeine Psychiatrie	171	0,7%	236	0,9%
2950. Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Suchtbehandlung	14	0,1%	6	0,0%
2951. Allgemeine Psychiatrie/Schwerpunkt Gerontopsychiatrie	200	0,9%	209	0,8%
3100. Psychosomatik/Psychotherapie	1	0,0%		
3200. Nuklearmedizin	1	0,0%		
3300. Strahlenheilkunde	97	0,4%	132	0,5%
3305. Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Hämatologie und internistische Onkologie	6	0,0%	14	0,1%
3350. Strahlenheilkunde/Schwerpunkt Radiologie	2	0,0%	8	0,0%
3390. Strahlenheilkunde	5	0,0%	6	0,0%
3400. Dermatologie	157	0,7%	194	0,7%
3500. Zahn- und Kieferheilkunde, Mund- und Kieferchirurgie	45	0,2%	57	0,2%
3600. Intensivmedizin	764	3,3%	783	3,0%
3601. Intensivmedizin/Schwerpunkt Innere Medizin	73	0,3%	49	0,2%
3618. Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie	24	0,1%	14	0,1%
3621. Intensivmedizin/Herzchirurgie	1	0,0%	3	0,0%
3650. Intensivmedizin/Schwerpunkt Chirurgie	10	0,0%	10	0,0%
3690. Intensivmedizin	38	0,2%	23	0,1%
3691. Intensivmedizin	17	0,1%		
3700. sonstige Fachabteilung I	591	2,6%	463	1,8%
3752. Palliativmedizin	137	0,6%	170	0,7%
3753. Schmerztherapie	1	0,0%	1	0,0%

1.7.2 Verteilung der Fachabteilungen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
3755. Wirbelsäulenchirurgie	18	0,1%	13	0,1%
3790. Sonstige Fachabteilung II	210	0,9%	68	0,3%

2 Daten aus der Risikostatistik

2.1 Basisdaten

Angaben über Krankenhäuser mit Risikostatistik	2020	2019
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl Krankenhäuser mit Risikostatistik	246	250
Davon Anzahl Krankenhäuser mit Patienten mit Dekubitus ab Grad 2 vorhanden	198	192
Davon Anzahl Krankenhäuser mit erfolgter QS-Dokumentation	198	191

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit Dekubitus	23073/1683116	1,4%	26107/1955475	1,3%
Grad 2 (L89.1)	14814/23073	64,2%	16668/26107	63,8%
Grad 3 (L89.2)	5208/23073	22,6%	5956/26107	22,8%
Grad 4 (L89.3)	2617/23073	11,3%	3063/26107	11,7%
Grad n.n.bez. (L89.9)	666/23073	2,9%	558/26107	2,1%

2.2 Altersverteilung (Daten aus der Risikostatistik)

Altersverteilung - Patienten gesamt	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten gesamt	1683116/1683116	100,0%	1955475/1955475	100,0%
20-33 Jahre	215884/1683116	12,8%	250561/1955475	12,8%
34-46 Jahre	194551/1683116	11,6%	223258/1955475	11,4%
47-54 Jahre	157162/1683116	9,3%	189760/1955475	9,7%
55-61 Jahre	197008/1683116	11,7%	221577/1955475	11,3%
62-68 Jahre	201886/1683116	12,0%	230374/1955475	11,8%
69-72 Jahre	124959/1683116	7,4%	141264/1955475	7,2%
73-76 Jahre	116706/1683116	6,9%	139717/1955475	7,1%
77-80 Jahre	157362/1683116	9,3%	195593/1955475	10,0%
81-85 Jahre	179742/1683116	10,7%	200044/1955475	10,2%
>= 86 Jahre	137856/1683116	8,2%	163265/1955475	8,3%

Statistische Alterswerte	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
gesamt (Anzahl)	1683116		1955475	
Minimum (Jahre)	20		0	
Median (Jahre)	64,0		64,0	
Mittelwert (Jahre)	61,4		61,4	
Maximum (Jahre)	120		119	

Altersverteilung - Patienten mit Dekubitus	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten gesamt	23073/1683116	1,4%	26107/1955475	1,3%
20-33 Jahre	135/23073	0,6%	206/26107	0,8%
34-46 Jahre	382/23073	1,7%	486/26107	1,9%
47-54 Jahre	758/23073	3,3%	913/26107	3,5%
55-61 Jahre	1580/23073	6,8%	1758/26107	6,7%
62-68 Jahre	2471/23073	10,7%	2649/26107	10,1%
69-72 Jahre	1849/23073	8,0%	2033/26107	7,8%
73-76 Jahre	2116/23073	9,2%	2515/26107	9,6%
77-80 Jahre	3416/23073	14,8%	3956/26107	15,2%
81-85 Jahre	4873/23073	21,1%	5184/26107	19,9%
>= 86 Jahre	5493/23073	23,8%	6407/26107	24,5%

Statistische Alterswerte (Patienten mit Dekubitus)	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
gesamt (Anzahl)	23073		26107	
Minimum (Jahre)	20		20	
Median (Jahre)	79,0		79,0	
Mittelwert (Jahre)	76,6		76,5	
Maximum (Jahre)	106		105	

2.3 Risikofaktoren (Daten aus der Risikostatistik)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Diabetes mellitus	271732/1683116	16,1%	312748/1955475	16,0%
Dauer der Beatmung 25 bis 72 Stunden	8819/1683116	0,5%	9483/1955475	0,5%
Dauer der Beatmung 73 bis 240 Stunden	8505/1683116	0,5%	8513/1955475	0,4%
Dauer der Beatmung über 240 Stunden	5669/1683116	0,3%	5992/1955475	0,3%
eingeschränkte Mobilität	237053/1683116	14,1%	271781/1955475	13,9%
Infektion	99320/1683116	5,9%	118640/1955475	6,1%
Demenz und Vigilanzstörung	66891/1683116	4,0%	77636/1955475	4,0%
Untergewicht und Mangelernährung	32414/1683116	1,9%	36563/1955475	1,9%
Inkontinenz	171918/1683116	10,2%	196772/1955475	10,1%
Adipositas	24911/1683116	1,5%	29876/1955475	1,5%
weitere schwere Erkrankungen	307271/1683116	18,3%	329822/1955475	16,9%

Dauer der Beatmung		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
		Anzahl	Anzahl
gesamt	(Anzahl)	36796	42807
Minimum	(Stunden)	1	1
Median	(Stunden)	45,0	31,0
Mittelwert	(Stunden)	121,9	117,0
Maximum	(Stunden)	3688	6290

Inhalt Gesamtauswertung 2020

Modul DEK

Dekubitusprophylaxe

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

1.3 Risikofaktoren zum verwendeten Dekubitus-Score für QI-ID 50009 © IQTIG 2021

2 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

2.1 Transparenzkennzahl: Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2 (TKez 52326)

2.2 Transparenzkennzahl: Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3 (TKez 521801)

2.3 Transparenzkennzahl: Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet (TKez 521800)

3 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4

3.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4 (QI-ID 52010)

1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

Qualitätsziel: Möglichst wenig neu aufgetretene Dekubitalulcera Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad/bezeichneter Kategorie bei Patientinnen und Patienten, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden oder für die nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

1.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)


Indikator-ID: 52008

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik

Zähler: Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert; Kennzahl zum nachfolgenden Qualitätsindikator

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1) (ID 52008)	5979/1683116	0,36%	6409/1955475	0,33%
Vertrauensbereich		(0,35% - 0,36%)		(0,32% - 0,34%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

Indikator-ID: 52009

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik

Zähler: Patientinnen und Patienten mit Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad / bezeichneter Kategorie, die ohne Dekubitus aufgenommen wurden oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: $\leq 2,32$ (95. Perzentil)

Kalkulatorische Kennzahlen	2020	2019
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
beobachtet (O) °	5979	6409
O_52009	0,36%	0,33%
vorhergesagt (E) *	6.276,27	6.921,97
E_52009	0,37%	0,35%
Gesamt	1683116	1955475
O - E *	-0,02%	-0,03%

° Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichnetem Grad/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand.

* Erwartete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, risikoadjustiert nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009.

Der Zähler der kalkulatorischen Kennzahl mit der Kennzahl-ID E_52009 wird durch die kalkulatorische Kennzahl mit der Kennzahl-ID 23014_52009 berechnet und bildet den Score zur logistischen Regression für den Indikator mit der QI-ID 52009 ab.

Der Nenner der kalkulatorischen Kennzahl mit der Kennzahl-ID E_52009 wird durch die kalkulatorische Kennzahl mit der Kennzahl-ID 24851_52009 berechnet und bildet alle vollstationären Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik ab.

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
O / E ** (ID 52009)	0,95		0,93	
Vertrauensbereich	(0,93 - 0,98)		(0,90 - 0,95)	

** Verhältnis der beobachteten Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, zur erwarteten Rate.


Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades/bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, kleiner ist als erwartet und umgekehrt.

Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, ist 20% größer als erwartet.

O / E = 0,9 Die beobachtete Rate an Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2 bis 4 oder nicht näher bezeichneten Grades, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand, ist 10% kleiner als erwartet.

1.2 Risikoadjustierung nach logistischem Dekubitus-Score für QI-ID 52009: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

1.3 Risikofaktoren zum verwendeten Dekubitus-Score für QI-ID 50009 © IQTIG 2021

Risikofaktoren

Referenzwahrscheinlichkeit: 0,016 % (Odds: 0,000)					
Risikofaktor	Regressionskoeffizient	Std.-Fehler	Z-Wert	Odds-Ratio	95 %-Vertrauensbereich
Konstante	-8,734583163365571	0,038	-228,073	-	-
Alter (linear zwischen 32 und 97 Jahren)	0,101999827818655	0,004	27,618	1,107	1,099 - 1,115
Alter (quadratisch zwischen 32 und 97 Jahren)	-0,001857669857455	0,000	-16,331	0,998	0,998 - 0,998
Alter (kubisch zwischen 32 und 97 Jahren)	0,000013736019669	0,000	12,841	1,000	1,000 - 1,000
Dauer der Beatmung 24 bis 71 Stunden	0,864114983348136	0,025	34,547	2,373	2,259 - 2,492
Dauer der Beatmung 72 bis 239 Stunden	1,371700957044878	0,020	70,317	3,942	3,794 - 4,096
Dauer der Beatmung ab 240 Stunden	2,357188635673957	0,016	152,037	10,561	10,245 - 10,887
Diabetes Mellitus	0,153009014322986	0,009	16,300	1,165	1,144 - 1,187
Eingeschränkte Mobilität	0,822152834294930	0,009	86,600	2,275	2,233 - 2,318
Infektion	0,680259714477956	0,011	63,077	1,974	1,933 - 2,017
Demenz und Vigilanzstörung	0,132320821037535	0,013	10,173	1,141	1,113 - 1,171
Inkontinenz	0,777486052679911	0,010	80,258	2,176	2,135 - 2,218
Untergewicht und Mangelernährung	0,657475809491068	0,013	49,002	1,930	1,880 - 1,981
Adipositas	0,205841273973177	0,027	7,621	1,229	1,165 - 1,295
Weitere schwere Erkrankungen	1,220675257638296	0,010	119,205	3,389	3,322 - 3,458

2 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Grad/Kategorie 1)

2.1 Transparenzkennzahl: Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2 (TKez 52326)


Indikator-ID: 52326

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24854_52326)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 2, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 52326)	5274/1683116	0,31%	5607/1955475	0,29%
Vertrauensbereich		(0,31% - 0,32%)		(0,28% - 0,29%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

2.2 Transparenzkennzahl: Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3 (TKez 521801)


Indikator-ID: 521801

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24855_521801)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 3, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 3, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 521801)	759/1683116	0,05%	828/1955475	0,04%
Vertrauensbereich		(0,04% - 0,05%)		(0,04% - 0,05%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

2.3 Transparenzkennzahl: Stationär erworbener Dekubitalulcus Grad/Kategorie nicht näher bezeichnet (TKez 521800)


Indikator-ID: 521800

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24853_521800)

Zähler: Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus nicht näher bezeichneter Grad / bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Nicht definiert

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten mit mindestens einem Dekubitus nicht näher bezeichneter Grad / bezeichneter Kategorie, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 521800)	132/1683116	0,01%	121/1955475	0,01%
Vertrauensbereich		(0,01% - 0,01%)		(0,01% - 0,01%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

3 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4

Qualitätsziel: Keine neu aufgetretenen Dekubitalulcera Grad/Kategorie 4 bei Patientinnen und Patienten, die ohne Dekubitus Grad/Kategorie 4 aufgenommen wurden oder für die nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

3.1 Alle Patientinnen und Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulcus Grad/Kategorie 4 (QI-ID 52010)


Indikator-ID: 52010

Grundgesamtheit (Nenner): Alle vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren aus der Risikostatistik (Kalkulatorische Kennzahl 24852_52010)

Zähler: Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 4, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand

Referenzbereich: Sentinel-Event

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen und Patienten ab 20 Jahren mit mindestens einem Dekubitus Grad/Kategorie 4, der im Krankenhaus erworben wurde oder für den nicht angegeben wurde, dass der Dekubitus bereits bei Aufnahme bestand (ID 52010)	61/1683116	0,00%	77/1955475	0,00%
Vertrauensbereich		(0,00% - 0,00%)		(0,00% - 0,00%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit